2026
2027

Variétés



VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE DÉVELOPPEMENT
PAR LA SÉLECTION VARIÉTALE

Desmazières
An Agrico company.

Table des matières.









1 Édito
2 Acteur de référence
4 Nos marchés
6 FRAIS : four, purée, potage
32 FRAIS : frites ménagères
50 FRAIS : chair ferme
60 INDUSTRIE : frites
78 INDUSTRIE : chips
88 Marché biologique
94 Index
98 Légende
100 Le portail : votre outil
101 Vos contacts

Desmazières a pris toutes les précautions pour la réalisation de ce catalogue. Toutefois, veuillez noter que toute information peut être sujette à modification et que Desmazières n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenus responsables des dommages résultants ou liés aux informations contenues dans ce catalogue. Photos et images non contractuelles.

S'engager à vos côtés

Ce catalogue variétal est bien plus qu'un simple support : il incarne notre savoir-faire variétal et technique au service de votre réussite. Année après année, nous mettrons notre expertise variétale à votre service. Chaque variété de notre gamme a été sélectionnée pour répondre aux défis agronomiques, économiques et environnementaux de votre métier.

La campagne 2026 a de nouveau été marquée par des conditions extrêmes : températures élevées et déficit hydrique de la plantation à l'arrachage. Ces situations sont de plus en plus fréquentes et pèsent sur les rendements, le calibre et la tenue en conservation.

Depuis plusieurs années, nos programmes de sélection en font des critères prioritaires : tolérance au stress hydrique et thermique, rusticité, aptitude à la conservation longue. Vous retrouverez dans ce catalogue notre gamme qui s'étoffe avec des variétés issues de ce travail.

Nous nous attachons à vous apporter une gamme variétale complète ainsi qu'une offre produit avec des services associés que nous faisons évoluer également. Notre engagement est d'être force de proposition.

Nouveauté cette année : vous pourrez retrouver dans le catalogue une classification par segmentation culinaire.

Enfin, notre équipe reste présente à vos côtés pour vous conseiller. Cette proximité reste essentielle pour nous : c'est elle qui permet de partager les connaissances et de vous apporter les préconisations les plus adaptées à votre situation. ■



Édouard FOURRIER
Directeur Général

Une culture pomme de terre.

Un acteur de référence pour aujourd'hui et pour demain

Depuis plus de 50 ans, nous partageons une passion commune : la culture de la pomme de terre. Cette histoire, nous l'avons construite avec vous, en alliant savoir-faire, innovation et proximité.

Chez Desmazières, nous avançons avec une conviction forte : accompagner la filière face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Cela passe par des solutions variétales adaptées, une écoute attentive des besoins du terrain et des réponses sur mesure pour anticiper les évolutions du marché.

À l'heure des changements climatiques et sociétaux, notre engagement reste fort. Fidèles à nos racines et ouverts sur le monde grâce à notre appartenance au groupe Agrico, nous continuons d'innover pour construire une agriculture durable et responsable.

Plus que jamais, Desmazières renforce son implication en faveur des générations futures, ouvrant la voie à une vision nouvelle et ambitieuse : celle d'être un acteur de référence et de préférence du secteur. ■

Desmazières en repères :

- **Plus de 50 ans d'expertise variétale**
- **Plus de 100 000 tonnes de plants commercialisées chaque année**
- **Une gamme variétale qui couvre les marchés du frais, de l'industrie et du bio**
- **Une équipe commerciale et technique mobilisée à vos côtés**
- **Un portail développé en interne pour un accès en temps réel à vos informations**



Une gamme adaptée,

à tous les marchés et tous les terroirs

Chaque année, nous commercialisons plus de 100 000 tonnes de plants de pomme de terre, en conventionnel comme en bio. Nos cinq segments couvrent tous les usages, du frais à l'industrie.

- **FRAIS : FOUR, PURÉE, POTAGE**
  PAGE 6
- **FRAIS : FRITES MÉNAGÈRES**
  PAGE 32
- **FRAIS : CHAIR FERME**
  PAGE 50
- **INDUSTRIE : FRITES**
  PAGE 60
- **INDUSTRIE : CHIPS**
  PAGE 78







FRAIS
FOUR, PUREÉ, POTAGE

Des variétés à la chair tendre, sélectionnées pour leur tenue, leur qualité de cuisson et leur goût, adaptées aux usages culinaires.

Agata.

Frais
Four, purée, potage

Une variété précoce de consommation courante plébiscitée pour sa qualité de peau et son niveau de rendement.

- **Tubercules de forme et calibre très homogènes**
- **Bonne résistance aux virus**
- **Très peu sensible aux endommagements à la récolte**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Lantmännen Seed B.V.
Croisement : BM 72-0052 x SIRCO
Numéro de clone : GE 77-0134
Droits d'obtenteur : Expiré

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : très hâtive / 8
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : assez élevé / 5
Feuillage - développement initial : rapide / 8
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6,5
Feuillage - tenue : moyenne / 6

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6
Finition de la peau : excellente / 8
Forme du tubercule : oblong
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : élevée / 8
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6
Dormance : courte / 4

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6
Coups bleus : peu à pas sensible / 8
Crevasses : assez sensible / 6
Endommagement à la récolte : peu sensible / 7
Éthylène : 5% de tubercules en plus ou en moins / 5

Poids sous eau : 316
Matière sèche : 17,6%
Type de cuisson : assez ferme / AB
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6
Grisaillement : assez sensible / 6,5
Fritabilité : mauvaise / 4
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : mauvaise / 4

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard + 20%. Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard.

Préparation des plants
Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation. Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 54 000 pieds/ha
32/35 mm : 50 000 pieds/ha
35/45 mm : 42 000 pieds/ha
45/50 mm : 39 000 pieds/ha
50/55 mm : 35 000 pieds/ha
55/60 mm : 32 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après 2 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 3 °C. Convient à stockage à long terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/agata

Résistances
Mildiou du feuillage : sensible / 5
Mildiou du tubercule : peu sensible / 6

Gale commune : sensible / 5
Gale poudreuse : peu sensible / 6
Fusariose : sensible / 5
Erwinia : sensible / 5
Dartrose : peu sensible / 6,5
Virus du mop top : peu sensible / 6,5

Virus - Enroulement : peu sensible / 6
Virus - A : - / -
Virus - X : sensible / 5
Virus - Yn : peu sensible / 7
Virus - Yntn : peu à pas sensible / 8

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.



Alouette.

Biologique | Frais (Four, purée, potage) | Industrie (4ème gamme)

Variété de conservation, polyvalente, à peau rouge, résistante au mildiou du feuillage et des tubercules, adaptée à la production conventionnelle et biologique.

- **Bonne tolérance aux endommagements mécaniques**
- **Tubercules réguliers et homogènes**
- **Bonne tolérance à la sécheresse**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : AR 02-139-1 x LAURA
Numéro de clone : AR 04-3153
Droits d'obtenteur : 31-12-2044

Variété disponible en agriculture biologique.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 6
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : mauve pâle
Nombre de baies : très élevé / 4
Feuillage - développement initial : rapide / 8
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7,5

Couleur de la peau : rouge
Couleur de la chair : jaune / 7,5
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : moyenne / 6
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6,5
Dormance : moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : peu à pas sensible / 8
Crevasses : assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6
Éthylène : 5% de tubercules en moins / 4

Poids sous eau : 389
Matière sèche : 21,1%
Type de cuisson : assez ferme / AB
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7
Grisaillement : peu sensible / 7
Fritabilité : supérieure à la moyenne / 6,5
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : - / -

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard + 10%.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 20%.

Préparation des plants
Plantez de préférence les tubercules dans un sol réchauffé, car le démarrage de cette variété est lent. Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation. Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 43 000 pieds/ha
35/45 mm : 37 000 pieds/ha
45/50 mm : 32 000 pieds/ha
50/55 mm : 30 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Fongicides
Malgré sa résistance au mildiou, surveillez le risque d'infection.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker en-dessous de 7 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/alouette

Résistances
Mildiou du feuillage : peu à pas sensible / 9
Mildiou du tubercule : peu à pas sensible / 9

Gale commune : peu sensible / 6
Gale poudreuse : peu sensible / 6,5
Fusariose : peu sensible / 7,5
Erwinia : - / -
Dartrose : - / -
Virus du mop top : sensible / 5,5

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : peu sensible / 7
Virus - Yn : peu à pas sensible / 8
Virus - Yntn : peu sensible / 7

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : assez résistante / 8
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.



Amaez.

Frais
Four, purée, potage

Variété alliant excellent rendement, très belle présentation et une grande aptitude à la conservation.

- **Bonne tolérance à la gale commune**
- **Dormance longue**
- **Bonne adaptabilité à de nombreux terroirs**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : AR 99-0161 x FESTIVAL
Numéro de clone : AR 05-495
Droits d'obtenteur : 31-12-2048

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 5,5
Couleur du germe : bleu violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : assez faible / 7
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final : assez faible / 6,5
Feuillage - épuration : normale / 6
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6
Finition de la peau : excellente / 8
Forme du tubercule : oblong
Régularité de la forme : assez régulière / 6,5
Tubérisation : moyenne / 6
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : assez longue / 7

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : peu sensible / 7
Crevasses : peu sensible / 7
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6
Éthylène : 5% à 15% de tubercules en plus / 6,5

Poids sous eau : 340
Matière sèche : 18,7%
Type de cuisson : assez ferme / AB
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7
Grisaillement : peu sensible / 7
Fritabilité : moyenne / 6
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : mauvaise / 5

Résistances

Mildiou du feuillage : peu sensible / 6
Mildiou du tubercule : peu sensible / 6

Gale commune : peu sensible / 6
Gale poudreuse : très sensible / 4,5
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : - / -
Dartrose : peu sensible / 7,5
Virus du mop top : - / -

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard.
Phosphore : conseil standard + 15%.
Potasse : conseil standard + 15%.

Préparation des plants
Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation.

Densité de plantation
28/35 mm : 48 000 pieds/ha
35/45 mm : 42 000 pieds/ha
45/50 mm : 38 000 pieds/ha
50/55 mm : 33 000 pieds/ha
55/60 mm : 30 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Fongicides
Un programme de pulvérisation préventif contre le mildiou est conseillé.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à un stockage à long terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/amaez

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : - / -
Virus - Yn : peu sensible / 6
Virus - Yntn : peu à pas sensible / 8

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : sensible / 1
Nématode blanc Pa 2 : sensible / 1
Nématode blanc Pa 3 : sensible / 1





Édouard VERMERSCH
Responsable Développement Variétal et Technique

“Gros potentiel de production, très belle qualité de présentation et excellente conservation, voilà le trio de qualités principales d'Amaez, qui répond pleinement aux attentes du marché. Sur le plan agronomique, Amaez nécessite une attention particulière. Du choix de la parcelle et de la date de plantation jusqu'à la fertilisation et à la gestion de l'irrigation, tout doit viser à favoriser le développement racinaire. Pour valoriser pleinement son potentiel génétique, quatre clés sont indispensables : optimiser la gestion du plant sans égermage, piloter la disponibilité en azote tout au long de la culture, privilégier les apports de phosphore à la tubérisation et de potasse au grossissement, et limiter l'irrigation en début et en fin de cycle.”

Arizona.

Frais
Four, purée, potage

Une variété primeur de consommation, à l'excellent rendement sous divers climats.

- **Tubercules de forme et calibre très homogènes**
- **Bonne tolérance à la sécheresse**
- **Résistances à de multiples virus**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : UK 150-19D22 x MASCOTTE
Numéro de clone : AR 98-0313
Droits d'obtenteur : 31-12-2040

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 7
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : assez élevé / 5
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6,5
Feuillage - tenue : moyenne / 6

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6
Finition de la peau : assez lisse / 6,5
Forme du tubercule : oblong
Régularité de la forme : régulière / 7,5
Tubérisation : moyenne / 6
Taille du tubercule : gros / 8
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse : peu sensible / 7
Coups bleus : peu sensible / 7
Crevasses : peu sensible / 7
Endommagement à la récolte : peu sensible / 7
Éthylène : 15% à 25% de tubercules en plus / 7

Poids sous eau : 301
Matière sèche : 17%
Type de cuisson : assez ferme / AB
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6,5
Grisaillement : - / -
Fritabilité : mauvaise / 4
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : mauvaise / 4

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard - 10%.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard.

Préparation des plants
Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 50 000 pieds/ha
35/55 mm : 45 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, n'utilisez pas de métribuzine, car elle peut provoquer une forte réaction du feuillage et une considérable réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

desmazieres.fr/arizona

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

Résistances
Mildiou du feuillage : très sensible / 4
Mildiou du tubercule : sensible / 5

Gale commune : sensible / 5,5
Gale poudreuse : très sensible / 2
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : peu sensible / 6
Dartrose : très sensible / 4
Virus du mop top : sensible / 5

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : peu à pas sensible / 8
Virus - Yn : peu à pas sensible / 8
Virus - Yntn : peu à pas sensible / 8

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.



Constance.

Frais
Four, purée, potage

Variété demi-hâtive de consommation, adaptée à de nombreux terroirs de par sa rusticité.

- **Belle présentation**
- **Tubercules de taille très uniforme**
- **Résultats très réguliers**



Caractéristiques générales

Obtenteur : J.L. Spijkman
Croisement : MARABEL x AR 93-1243
Numéro de clone : SA 02-0020
Droits d'obtenteur : 31-12-2044

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 7
Couleur du germe : bleu violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : moyen / 6
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6,5
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : excellente / 8
Forme du tubercule : oblong rond
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : moyenne / 6
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : moyenne / 6,5

Sensibilité et qualité

Repousse : peu sensible / 7
Coups bleus : peu à pas sensible / 8
Crevasses : peu sensible / 7
Endommagement à la récolte : très sensible / 4,5
Éthylène : 15% à 25% de tubercules en plus / 7

Poids sous eau : 358
Matière sèche : 19,7%
Type de cuisson : assez ferme / AB
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6,5
Grisaillement : assez sensible / 6,5
Fritabilité : assez mauvaise / 5,5
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : mauvaise / 4

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard + 15%.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 15%.

Préparation des plants
Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation. Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 48 000 pieds/ha
35/45 mm : 42 000 pieds/ha
45/50 mm : 37 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

desmazieres.fr/constance

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

Résistances
Mildiou du feuillage : sensible / 5
Mildiou du tubercule : très sensible / 4,5

Gale commune : peu sensible / 6
Gale poudreuse : très sensible / 3
Fusariose : peu sensible / 6,5
Erwinia : peu sensible / 6
Dartrose : peu sensible / 7
Virus du mop top : peu sensible / 6

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : peu sensible / 7
Virus - Yn : peu à pas sensible / 8
Virus - Yntn : peu sensible / 6,5

Nématode doré Ro 1/4 : - / -
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.



Ecrin.

Biologique | Frais
Four, purée, potage

Variété rustique adaptée à l'agriculture agroécologique et biologique.

- **Polyvalence culinaire**
- **Bonne résistance à la gale commune**
- **Bonne dormance**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Desmazières
Croisement : JA 96-0832 x MA 97-0150
Numéro de clone : DM 93-557-02
Droits d'obtenteur : 31-12-2047

AB AGRICULTURE BIOLOGIQUE — Variété disponible en agriculture biologique.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 6
Couleur du germe : vert rouge
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : moyen / 6
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final : assez bon / 7,5
Feuillage - épuration : plûtot facile / 7
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune pâle / 5,5
Finition de la peau : très lisse / 7,5
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : moyenne / 6
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6
Dormance : assez longue / 7

Sensibilité et qualité

Repousse : peu à pas sensible / 8
Coups bleus : peu sensible / 7
Crevasses : assez sensible / 6
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6,5
Éthylène : 5% de tubercules en plus ou en moins / 5

Poids sous eau : 350
Matière sèche : 19,2%
Type de cuisson : assez ferme / AB
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7
Grisaillement : assez sensible / 6,5
Fritabilité : moyenne / 6
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : mauvaise / 5

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard + 10%.
Phosphore : conseil standard + 10%.
Potasse : conseil standard + 20%.

Préparation des plants
Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement. Un troisième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 45 000 pieds/ha
35/45 mm : 39 000 pieds/ha
45/50 mm : 35 000 pieds/ha
50/55 mm : 30 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Fongicides
Malgré sa tolérance au mildiou, surveillez le risque d'infection.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à un stockage de moyen à long terme.

desmazieres.fr/ecrin

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

Résistances
Mildiou du feuillage : peu sensible / 6
Mildiou du tubercule : sensible / 5

Gale commune : peu sensible / 7
Gale poudreuse : - / -
Fusariose : sensible / 5,5
Erwinia : peu sensible / 7
Dartrose : peu sensible / 6,5
Virus du mop top : - / -

Virus - Enroulement : très sensible / 4
Virus - A : peu sensible / 6
Virus - X : peu sensible / 6
Virus - Yn : peu sensible / 7
Virus - Yntn : peu sensible / 6

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.




Esmee.

Frais
Four, purée, potage

Variété de consommation avec une belle peau rouge, demi-précoce et un bon rendement.

- **Bel aspect**
- **Gros tubercules**
- **Commercialisation précoce**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : LAURA x RODEO
Numéro de clone : AR 01-0410
Droits d'obtenteur : 31-12-2043

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 6,5
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : mauve pâle
Nombre de baies : très élevé / 4
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : assez bon / 7,5
Feuillage - épuration : plutôt facile / 7
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : rouge
Couleur de la chair : jaune / 7
Finition de la peau : excellente / 8
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : assez régulière / 6,5
Tubérisation : moyenne / 6
Taille du tubercule : gros / 8
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : peu à pas sensible / 8
Crevasses : assez sensible / 6
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6,5
Éthylène : 5% de tubercules en plus ou en moins / 5

Poids sous eau : 326
Matière sèche : 18%
Type de cuisson : assez ferme / AB
Noircissement après cuisson : sensible / 5,5
Grisaillement : assez sensible / 6
Fritabilité : moyenne / 6
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : mauvaise / 4

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard + 10%.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard.

Préparation des plants
Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement. Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 43 000 pieds/ha
35/45 mm : 38 000 pieds/ha
45/50 mm : 33 000 pieds/ha
50/55 mm : 30 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, n'utilisez pas de métribuzine, car elle peut provoquer une forte réaction du feuillage et une considérable réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

desmazieres.fr/esmee

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

Résistances
Mildiou du feuillage : très sensible / 4,5
Mildiou du tubercule : peu sensible / 7

Gale commune : peu sensible / 6
Gale poudreuse : peu sensible / 6,5
Fusariose : peu sensible / 7
Erwinia : peu sensible / 7
Dartrose : sensible / 5,5
Virus du mop top : très sensible / 4

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : peu à pas sensible / 8
Virus - Yn : peu à pas sensible / 8
Virus - Yntn : peu sensible / 7

Nématode doré Ro 1/4 : - / -
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.



Levante.

Biologique

Frais
Four, purée, potage

Variété de conservation, à haut rendement, résistante au mildiou du feuillage et présentant une belle peau jaune.

- **Tubérisation élevée**
- **Belle peau**
- **Bonne aptitude au stockage**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : AR 01-3218 x ALMERA
Numéro de clone : AR 07-3009
Droits d'obtenteur : 31-12-2048

Variété disponible en agriculture biologique.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 5,5
Couleur du germe : vert rouge
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : assez élevé / 5,5
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : assez régulière / 6,5
Tubérisation : élevée / 8
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : moyenne / 6,5

Sensibilité et qualité

Repousse : peu sensible / 7
Coups bleus : assez sensible / 6,5
Crevasses : peu sensible / 7
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6
Éthylène : 5% de tubercules en moins / 4

Poids sous eau : 365
Matière sèche : 19,9%
Type de cuisson : légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7
Grisaillement : sensible / 5,5
Fritabilité : assez mauvaise / 5,5
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : mauvaise / 4,5

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard. Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard.

Préparation des plants
Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement. Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 41 000 pieds/ha
35/45 mm : 36 000 pieds/ha
45/50 mm : 30 000 pieds/ha
50/55 mm : 27 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Fongicides
Malgré sa résistance au mildiou, surveillez le risque d'infection.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à un stockage de moyen à long terme.

desmazieres.fr/levante

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

Résistances
Mildiou du feuillage : peu à pas sensible / 8,5
Mildiou du tubercule : peu sensible / 7,5

Gale commune : sensible / 5
Gale poudreuse : peu sensible / 6,5
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : - / -
Dartrose : peu sensible / 7,5
Virus du mop top : très sensible / 4,5

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : - / -
Virus - Yn : peu sensible / 6
Virus - Yntn : peu à pas sensible / 8,5

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.



Manitou.

Frais
Four, purée, potage

Variété de conservation avec une très belle peau rouge, offrant un rendement élevé.

- **Gros tubercules**
- **Bonne tolérance à la sécheresse**
- **Bonne aptitude à la conservation**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Croisement : LAURA x MARANCA
Numéro de clone : MA 96-0419
Droits d'obtenteur : 31-12-2037

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : tardive / 5
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : violette
Nombre de baies : assez élevé / 5
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : plutôt facile / 7
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : rouge
Couleur de la chair : jaune beurre / 6
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : assez régulière / 6,5
Tubérisation : assez élevée / 7
Taille du tubercule : gros / 8
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : assez courte / 5,5

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : peu sensible / 7,5
Crevasses : assez sensible / 6
Endommagement à la récolte : sensible / 5,5
Éthylène : 15% à 25% de tubercules en plus / 7

Poids sous eau : 351
Matière sèche : 19,4%
Type de cuisson : légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7
Grisaillement : - / -
Fritabilité : assez mauvaise / 5,5
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : mauvaise / 4,5

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 10%.

Préparation des plants
Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 47 000 pieds/ha
35/45 mm : 41 000 pieds/ha
45/50 mm : 36 000 pieds/ha
50/55 mm : 31 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, n'utilisez pas de métribuzine, car elle peut provoquer une forte réaction du feuillage et une considérable réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/manitou

Résistances
Mildiou du feuillage : sensible / 5
Mildiou du tubercule : peu sensible / 6

Gale commune : peu sensible / 6
Gale poudreuse : peu sensible / 6
Fusariose : peu sensible / 7
Erwinia : peu sensible / 6
Dartrose : peu sensible / 7
Virus du mop top : peu sensible / 7

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : peu sensible / 7
Virus - Yn : peu sensible / 6,5
Virus - Yntn : peu sensible / 7

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : résistante / 9
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.



Montana

Frais
Four, purée, potage

Variété à chair jaune, très productive, alliant lavabilité et conservation.

- **Longue dormance**
- **Grosse productivité**
- **Tubérisation élevée**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Böhm
Croisement : E 99/73/126 x MERIDA
Numéro de clone : E 05/183/164
Droits d'obtenteur : 31-12-2043

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 6
Couleur du germe : -
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : assez faible / 7
Feuillage - développement initial : moyen / 6,5
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6,5
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : assez lisse / 6,5
Forme du tubercule : oblong
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : assez élevée / 7
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : longue / 8

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : assez sensible / 6
Crevasses : assez sensible / 6
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6,5
Éthylène : 15% à 25% de tubercules en plus / 7

Poids sous eau : 336
Matière sèche : 18,5%
Type de cuisson : assez ferme / AB
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6
Grisaillement : peu sensible / 7
Fritabilité : assez mauvaise / 5,5
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : mauvaise / 5

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard - 5%.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 15%.

Préparation des plants
Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement. Plantez de préférence les tubercules dans un sol réchauffé, car le démarrage de cette variété est lent. Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 40 000 pieds/ha
35/45 mm : 35 000 pieds/ha
45/50 mm : 33 000 pieds/ha
50/55 mm : 30 000 pieds/ha
Plantez Leonore un peu plus profondément que les autres variétés pour éviter que les tubercules ne verdissent.

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à stockage à long terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/montana

Résistances
Mildiou du feuillage : sensible / 5
Mildiou du tubercule : peu sensible / 6

Gale commune : peu sensible / 6,5
Gale poudreuse : - / -
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : sensible / 5
Dartrose : peu sensible / 6,5
Virus du mop top : peu sensible / 6,5

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : peu sensible / 7
Virus - Yn : peu sensible / 7
Virus - Yntn : peu sensible / 7,5

Nématode doré Ro 1/4 : assez résistante / 7
Nématode doré Ro 2/3 : assez résistante / 8
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -



Twister.

Biologique | Frais
Four, purée, potage

Variété de consommation adaptée à la culture conventionnelle et biologique, résistante au mildiou du feuillage et du tubercule.

- **Bel aspect**
- **Bonne aptitude au stockage**
- **Excellente productivité**



Caractéristiques générales

Obtenteur : G.W. te Winkel
Croisement : ARG 96-0739 x AR 02-9113
Numéro de clone : TW 08-1507
Droits d'obtenteur : 31-12-2048

Variété disponible en agriculture biologique.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 7
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : mauve pâle
Nombre de baies : assez élevé / 5,5
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : assez bon / 7,5
Feuillage - épuration : normale / 6,5
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong rond
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : moyenne / 6,5
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6,5
Dormance : assez longue / 7

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : peu à pas sensible / 8
Crevasses : assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte : peu sensible / 7
Éthylène : 5% de tubercules en moins / 4

Poids sous eau : 345
Matière sèche : 19%
Type de cuisson : assez ferme / AB
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6,5
Grisaillement : assez sensible / 6
Fritabilité : mauvaise / 5
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : mauvaise / 4

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard + 20%.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard.

Préparation des plants
Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement. Dégermer une fois est optionnel.

Densité de plantation
28/35 mm : 41 000 pieds/ha
35/45 mm : 37 000 pieds/ha
45/50 mm : 34 000 pieds/ha
50/55 mm : 30 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, n'utilisez pas de métribuzine, car elle peut provoquer une forte réaction du feuillage et une considérable réduction du rendement.

Fongicides
Malgré sa résistance au mildiou, surveillez le risque d'infection.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 6 °C. Convient à un stockage de moyen à long terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/twister

Résistances
Mildiou du feuillage : peu à pas sensible / 9
Mildiou du tubercule : peu à pas sensible / 9

Gale commune : peu sensible / 6
Gale poudreuse : sensible / 5
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : - / -
Dartrose : peu sensible / 7
Virus du mop top : peu sensible / 6

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : - / -
Virus - Yn : peu à pas sensible / 8
Virus - Yntn : peu à pas sensible / 8

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.



Vogue.

Frais
Four, purée, potage

Variété à tubérisation rapide produisant des gros tubercules de calibres uniformes.

- **Bonne productivité**
- **Chair jaune**
- **Bonne qualité gustative**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Konst Research B.V.
Croisement : MARABEL x AMOROSA
Numéro de clone : KO 03-2027
Droits d'obtenteur : 31-12-2046

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 6,5
Couleur du germe : vert rouge
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : très élevé / 4
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : assez bon / 7,5
Feuillage - épuration : normale / 6
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune / 7
Finition de la peau : moyenne / 6
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : assez faible / 5,5
Taille du tubercule : gros / 8
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : assez courte / 5

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : peu à pas sensible / 8
Crevasses : assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6
Éthylène : 5% de tubercules en plus ou en moins / 5

Poids sous eau : 311
Matière sèche : 17,3%
Type de cuisson : assez ferme / AB
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7,5
Grisaillement : - / -
Fritabilité : mauvaise / 5
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : mauvaise / 4

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard - 10%. Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 10%.

Préparation des plants
Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation. Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 48 000 pieds/ha
35/45 mm : 42 000 pieds/ha
45/50 mm : 36 000 pieds/ha
50/55 mm : 33 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/vogue

Résistances
Mildiou du feuillage : très sensible / 4
Mildiou du tubercule : peu sensible / 6

Gale commune : peu sensible / 6
Gale poudreuse : très sensible / 2
Fusariose : peu sensible / 6,5
Erwinia : - / -
Dartrose : très sensible / 4,5
Virus du mop top : très sensible / 4

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : peu à pas sensible / 8
Virus - Yn : peu sensible / 6,5
Virus - Yntn : sensible / 5

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.







FRAIS
FRITES MÉNAGÈRES

Tenue, coloration, goût : des variétés taillées pour les frites maison et répondre aux attentes du consommateur.

Artemis.

Frais
Frites ménagères,
four, purée, potage

Variété précoce de consommation offrant un excellent rendement, idéale pour les frites ménagères.

- **Excellente qualité de friture**
- **Très peu sensible aux endommagements à la récolte**
- **Variété rustique**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : RIANTA x RENSKA
Numéro de clone : AR 87-0039
Droits d'obtenteur : 31-12-2029

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 7
Couleur du germe : vert
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : très élevé / 4
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final : moyen / 7
Feuillage - épuration : plutôt facile / 7
Feuillage - tenue : moyenne / 6

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : assez élevée / 7
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : assez courte / 5,5

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : peu à pas sensible / 8
Crevasses : peu sensible / 7
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6,5
Éthylène : - / -

Poids sous eau : 375
Matière sèche : 20,4%
Type de cuisson : légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6
Grisaillement : - / -
Fritabilité : moyenne / 6
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : moyenne / 6

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard + 10%.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard.

Préparation des plants
Plantez de préférence les tubercules dans un sol réchauffé, car le démarrage de cette variété est lent. Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation.

Densité de plantation
28/35 mm : 45 000 pieds/ha
35/45 mm : 42 000 pieds/ha
45/50 mm : 38 000 pieds/ha
50/55 mm : 32 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour conserver la qualité de friture, ne pas stocker en dessous de 7 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/artemis

Résistances
Mildiou du feuillage : sensible / 5
Mildiou du tubercule : peu à pas sensible / 8

Gale commune : sensible / 5,5
Gale poudreuse : sensible / 5,5
Fusariose : sensible / 5
Erwinia : peu sensible / 6
Dartrose : peu sensible / 7
Virus du mop top : peu sensible / 6

Virus - Enroulement : peu sensible / 7
Virus - A : - / -
Virus - X : sensible / 5,5
Virus - Yn : peu sensible / 6,5
Virus - Yntn : peu à pas sensible / 8

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -



Auriera

Frais
Frites
ménagères

Variété de consommation possédant un excellent rendement et une belle présentation pour une utilisation parfaite en frites ménagères.

- **Excellente fritabilité**
- **Bonne dormance**
- **Bonne tubérisation**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Grocep
Croisement : 68 00 2 x VICTORIA
Numéro de clone : DG 66 08 1
Droits d'obtenteur : 31-12-2048

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 6
Couleur du germe : -
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : - / -
Feuillage - développement initial : rapide / 8
Feuillage - développement final : - / -
Feuillage - épuration : normale / 6
Feuillage - tenue : ferme / 8

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6
Finition de la peau : moyenne / 6
Forme du tubercule : oblong rond
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : assez élevée / 7
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : moyenne / 6,5

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6
Coups bleus : assez sensible / 6
Crevasses : peu sensible / 7
Endommagement à la récolte : peu sensible / 7
Éthylène : 5% de tubercules en plus ou en moins / 5

Poids sous eau : 368
Matière sèche : 20,1%
Type de cuisson : légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6
Grisaillement : assez sensible / 6,5
Fritabilité : bonne / 7
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : moyenne / 6

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard.
Phosphore : conseil standard + 5%.
Potasse : conseil standard + 10%.

Préparation des plants
Stockez les semences à une certaine température pour éviter qu'elles ne lèvent de manière irrégulière.

Densité de plantation
28/35 mm : 40 000 pieds/ha
35/45 mm : 35 000 pieds/ha
45/50 mm : 32 000 pieds/ha
50/55 mm : 30 000 pieds/ha
55/60 mm : 27 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 6 °C. Convient à un stockage de moyen à long terme.

desmazieres.fr/auriera

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

Résistances
Mildiou du feuillage : peu sensible / 6
Mildiou du tubercule : peu sensible / 7

Gale commune : très sensible / 4,5
Gale poudreuse : très sensible / 2
Fusariose : peu sensible / 6,5
Erwinia : peu sensible / 6
Dartrose : peu sensible / 6,5
Virus du mop top : - / -

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : peu sensible / 6
Virus - Yn : peu sensible / 6,5
Virus - Yntn : peu sensible / 7

Nématode doré Ro 1/4 : - / -
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -



Babylon.

Biologique | Frais Frites ménagères | Industrie Frites, chips, 4ème gamme

Variété de conservation à chair jaune, destinée au marché du frais et de la transformation, ayant un excellent rendement.

- **Excellente qualité de friture**
- **Facilité de production**
- **Bonne capacité de stockage**



Caractéristiques générales

Obtenteur : R.K. Bakker
Croisement : AGRIA MUTANT
Numéro de clone : BA 06-0001
Droits d'obtenteur : 31-12-2046

Variété disponible en agriculture biologique.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : tardive / 5
Couleur du germe : bleu violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : nul / 8
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6,5
Feuillage - tenue : ferme / 8

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune / 7
Finition de la peau : moyenne / 6
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : moyenne / 6
Taille du tubercule : gros / 8
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : longue / 8

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6
Coups bleus : assez sensible / 6
Crevasses : assez sensible / 6

Endommagement à la récolte : sensible / 5,5
Éthylène : 5% de tubercules en plus ou en moins / 5

Poids sous eau : 401
Matière sèche : 21,7%
Type de cuisson : plutôt farineuse / BC
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7
Grisaillement : peu sensible / 7
Fritabilité : excellente / 8
Répartition de la matière sèche : bonne / 7
Chipabilité : bonne / 7

Résistances

Mildiou du feuillage : sensible / 5,5
Mildiou du tubercule : peu sensible / 6,5

Gale commune : sensible / 5
Gale poudreuse : - / -
Fusariose : peu sensible / 7
Erwinia : - / -
Dartrose : très sensible / 4,5
Virus du mop top : peu sensible / 6,5

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard - 10%.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 10%.

Préparation des plants
Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation. Dégermer une fois est optionnel.

Densité de plantation
28/35 mm : 50 000 pieds/ha
35/45 mm : 45 000 pieds/ha
35/55 mm : 40 000 pieds/ha
45/50 mm : 35 000 pieds/ha
50/55 mm : 30 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

Fongicides
Un programme de pulvérisation préventif contre le mildiou est conseillé.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à stockage à long terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/babylon

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : - / -
Virus - Yn : peu sensible / 7,5
Virus - Yntn : peu sensible / 7

Nématode doré Ro 1/4 : assez résistante / 8
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -





Édouard VERMERSCH
Responsable Développement Variétal et Technique

“ Fruit d'un modèle de sélection innovant, Babylon répond à une large gamme d'exigences agronomiques, environnementales, techniques et économiques. Grâce à sa chair jaune, ses gros calibres offrent, même après 10 mois de stockage, des frites de grande qualité, alliant un fondant exceptionnel à une croustillance parfaite. Ses atouts nous permettent de proposer Babylon en plant biologique, répondant ainsi aux besoins spécifiques de ce marché. ”

Excellency.

Frais
Frites
ménagères

Variété de consommation polyvalente, belle présentation, très adaptée pour les frites ménagères.

- **Bonne qualité de friture à long terme**
- **Bonne conservation**
- **Forte teneur en matière sèche**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : LADY OLYMPIA x RED ONE
Numéro de clone : AR 98-1196
Droits d'obtenteur : 31-12-2042

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 6,5
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : moyen / 6
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : assez bon / 7,5
Feuillage - épuration : normale / 6,5
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : assez régulière / 6,5
Tubérisation : moyenne / 6
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6
Dormance : moyenne / 6,5

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : peu sensible / 7
Crevasses : peu sensible / 7
Endommagement à la récolte : sensible / 5
Éthylène : 5% de tubercules en plus ou en moins / 5

Poids sous eau : 399
Matière sèche : 21,6%
Type de cuisson : plutôt farineuse / BC
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7
Grisaillement : assez sensible / 6
Fritabilité : bonne / 7
Répartition de la matière sèche : bonne / 7
Chipabilité : moyenne / 6

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard + 10%.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard.

Préparation des plants
Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation. Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 46 000 pieds/ha
35/45 mm : 39 000 pieds/ha
45/50 mm : 37 000 pieds/ha
50/55 mm : 34 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, n'utilisez pas de métribuzine, car elle peut provoquer une forte réaction du feuillage et une considérable réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à stockage à long terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/excellency


Résistances
Mildiou du feuillage : sensible / 5
Mildiou du tubercule : sensible / 5

Gale commune : peu sensible / 6
Gale poudreuse : sensible / 5
Fusariose : sensible / 5
Erwinia : sensible / 5
Dartrose : peu sensible / 6
Virus du mop top : peu à pas sensible / 8

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : peu à pas sensible / 8
Virus - Yn : peu sensible / 7
Virus - Yntn : peu sensible / 7,5

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.



Jolene.

Frais
Frites
ménagères

Variété de bonne conservation, adaptée à une utilisation en frites ménagères.

- **Excellente qualité de friture**
- **Très belle forme et qualité de présentation**
- **Bonne teneur en matière sèche**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : SAGITTA x AR 03-1491
Numéro de clone : AR 09-2556
Droits d'obtenteur : 31-12-2050

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 6
Couleur du germe : rouge
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : assez faible / 7
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7,5

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : assez élevée / 7
Taille du tubercule : assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse : peu sensible / 7
Coups bleus : peu sensible / 7
Crevasses : peu sensible / 7

Endommagement à la récolte : assez sensible / 6
Éthylène : 15% à 25% de tubercules en plus / 7

Poids sous eau : 389
Matière sèche : 21,1%
Type de cuisson : légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6,5
Grisaillement : peu sensible / 7
Fritabilité : bonne / 7
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : mauvaise / 5

Résistances

Mildiou du feuillage : très sensible / 4
Mildiou du tubercule : sensible / 5

Gale commune : peu sensible / 6
Gale poudreuse : peu sensible / 6,5
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : - / -
Dartrose : peu sensible / 7,5
Virus du mop top : peu sensible / 6

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 10%.

Préparation des plants
Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement. Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 45 000 pieds/ha
35/45 mm : 40 000 pieds/ha
45/50 mm : 37 000 pieds/ha
50/55 mm : 32 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à stockage à long terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/jolene

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : - / -
Virus - Yn : peu à pas sensible / 8
Virus - Yntn : peu à pas sensible / 8

Nématode doré Ro 1/4 : - / -
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -





Édouard VERMERSCH
Responsable Développement Variétal et Technique


« Jolene se distingue au champ par ses très larges folioles qui assurent une couverture rapide du sol et optimisent l'activité photosynthétique. Sur un cycle cultural d'environ 120 jours, elle produit des tubercules oblongs allongés, très réguliers et de calibre homogène.
Sa belle qualité de présentation, associée à des critères technologiques adaptés, lui confère des atouts indispensables pour répondre à la demande du marché du frais : une variété de longue conservation, utilisable en frites ménagères. Pour préserver ces qualités de présentation et de conservation, évitez une baisse trop rapide de la température de stockage. »

Rudolph.

Frais
Frites ménagères

Variété de conservation à peau rouge et chair blanche, avec un très bon rendement.

- **Bonne tolérance aux températures élevées**
- **Gros tubercules**
- **Bonne aptitude au stockage**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : CHIEFTAIN x STIRLING
Numéro de clone : UK 93-1-2
Droits d'obtenteur : 31-12-2035

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 5,5
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : mauve pâle
Nombre de baies : moyen / 6
Feuillage - développement initial : moyen / 6
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6,5
Feuillage - tenue : ferme / 8

Couleur de la peau : rouge
Couleur de la chair : blanche / 4
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong rond
Régularité de la forme : assez régulière / 6
Tubérisation : assez faible / 5
Taille du tubercule : gros / 8
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : assez longue / 7

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : peu sensible / 7
Crevasses : assez sensible / 6
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6
Éthylène : 5% à 15% de tubercules en plus / 6

Poids sous eau : 376
Matière sèche : 20,5%
Type de cuisson : assez ferme / AB
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6,5
Grisaillement : - / -
Fritabilité : supérieure à la moyenne / 6,5
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : assez mauvaise / 5,5

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard + 5%. Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 10%.

Préparation des plants
Une période de réchauffement ou pré-germination est recommandée. Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation. Dégermer une fois est optionnel.

Densité de plantation
28/40 mm : 44 000 pieds/ha
40/50 mm : 36 000 pieds/ha
50/55 mm : 33 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. En vue de son utilisation, ne pas stocker en dessous de 7 °C. Convient à un stockage à long terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/rudolph

Résistances
Mildiou du feuillage : sensible / 5,5
Mildiou du tubercule : sensible / 5,5

Gale commune : sensible / 5
Gale poudreuse : peu sensible / 7
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : peu sensible / 6
Dartrose : peu sensible / 7
Virus du mop top : peu sensible / 7

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : peu sensible / 6
Virus - Yn : sensible / 5
Virus - Yntn : peu sensible / 7

Nématode doré Ro 1/4 : - / -
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -



Tresor.

Frais
Frites ménagères,
four, purée, potage

Variété très hâtive, adaptée au marché du frais.

- **Très précoce en calibre et matière sèche**
- **Excellentes frites ménagères**
- **Très productive en gros calibres**



Caractéristiques générales

Obtenteur : CEBECO
Croisement : CORINE x FRESCO
Numéro de clone : -
Droits d'obtenteur : Expiré

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : hâtive / 7,5
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : - / -
Feuillage - développement initial : moyen / 6,5
Feuillage - développement final : - / -
Feuillage - épuration : normale / 6
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune pâle / 5,5
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : assez faible / 5,5
Taille du tubercule : gros / 8
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse : sensible / 5,5
Coups bleus : assez sensible / 6
Crevasses : très sensible / 4
Endommagement à la récolte : sensible / 5,5
Éthylène : - / -

Poids sous eau : 345
Matière sèche : 19%
Type de cuisson : légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6
Grisaillement : assez sensible / 6,5
Fritabilité : très bonne / 7,5
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : bonne / 7

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard.
Phosphore : conseil standard + 10%.
Potasse : conseil standard.

Préparation des plants
Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement.

Densité de plantation
28/35 mm : 47 000 pieds/ha
35/45 mm : 40 000 pieds/ha
45/50 mm : 36 000 pieds/ha
50/55 mm : 32 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 7 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/tresor

Résistances

Mildiou du feuillage : très sensible / 4
Mildiou du tubercule : peu à pas sensible / 8

Gale commune : peu sensible / 6,5
Gale poudreuse : très sensible / 2,5
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : peu sensible / 6,5
Dartrose : peu sensible / 6,5
Virus du mop top : - / -

Virus - Enroulement : peu sensible / 6
Virus - A : peu à pas sensible / 9
Virus - X : peu sensible / 7
Virus - Yn : peu sensible / 6
Virus - Yntn : peu à pas sensible / 8

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -



Twinner.

Biologique | Frais Frites ménagères

Variété précoce, résistante au mildiou du feuillage et du tubercule, adaptée à l'agriculture conventionnelle, agroécologique et biologique.

- **Bonne fritabilité**
- **Bel aspect**
- **Tubercules oblongs réguliers**



Caractéristiques générales

Obtenteur : G.W. te Winkel
Croisement : MA 98-0032 x AR 00-87-22
Numéro de clone : TW 07-0807
Droits d'obtenteur : 31-12-2046

Variété disponible en agriculture biologique.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : hâtive / 7,5
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : élevé / 4,5
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final : moyen / 7
Feuillage - épuration : normale / 6
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune / 7
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : assez faible / 5
Taille du tubercule : assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6,5
Dormance : moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : peu sensible / 7,5
Crevasses : peu sensible / 7
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6,5
Éthylène : 15% à 25% de tubercules en plus / 7

Poids sous eau : 359
Matière sèche : 19,7%
Type de cuisson : assez ferme / AB
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6,5
Grisaillement : assez sensible / 6
Fritabilité : supérieure à la moyenne / 6,5
Répartition de la matière sèche : excellente / 8
Chipabilité : mauvaise / 5

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard + 15%. Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard.

Préparation des plants
Twinner a une levée rapide après germination. Plantez de préférence dans un sol réchauffé. Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court réchauffement.

Densité de plantation
28/35 mm : 44 000 pieds/ha
35/45 mm : 36 000 pieds/ha
45/50 mm : 33 000 pieds/ha
50/55 mm : 30 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

Fongicides
Malgré sa résistance au mildiou, surveillez le risque d'infection.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

desmazieres.fr/twinner

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.


Résistances
Mildiou du feuillage : peu à pas sensible / 8
Mildiou du tubercule : peu à pas sensible / 9

Gale commune : sensible / 5,5
Gale poudreuse : très sensible / 4
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : - / -
Dartrose : peu sensible / 6,5
Virus du mop top : peu sensible / 6

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : - / -
Virus - Yn : peu sensible / 6,5
Virus - Yntn : sensible / 5

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.







FRAIS
CHAIR FERME

Des variétés à chair ferme, choisies pour leur tenue à la cuisson et leur qualité de texture, idéales pour les salades et poêlées où l'intégrité de la pomme de terre prime.

Chateau.

Frais
Chair ferme

Variété chair ferme, précoce, avec une bonne tubérisation, une belle présentation et une aptitude à la conservation.

- **Tubercules réguliers et homogènes**
- **Excellente qualité gustative**
- **Chair jaune**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : MA 98-0322 x AR 98-0341
Numéro de clone : AR 05-1443
Droits d'obtenteur : 31-12-2046

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : hâtive / 7,5
Couleur du germe : bleu violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : assez élevé / 5,5
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : plutôt facile / 7
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : élevée / 8
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : peu à pas sensible / 8
Crevasses : assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte : sensible / 5
Éthylène : 5% à 15% de tubercules en plus / 6

Poids sous eau : 350
Matière sèche : 19,2%
Type de cuisson : assez ferme / AB
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7,5
Grisaillement : peu sensible / 7,5
Fritabilité : mauvaise / 4
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : mauvaise / 4

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 20%.

Préparation des plants
Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement. Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 57 000 pieds/ha
35/45 mm : 50 000 pieds/ha
45/50 mm : 45 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/chateau

Résistances
Mildiou du feuillage : très sensible / 4
Mildiou du tubercule : sensible / 5,5

Gale commune : sensible / 5,5
Gale poudreuse : très sensible / 2
Fusariose : peu sensible / 7
Erwinia : - / -
Dartrose : très sensible / 4,5
Virus du mop top : sensible / 5

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : - / -
Virus - Yn : peu sensible / 7
Virus - Yntn : peu sensible / 6,5

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.




Ditta

Biologique | Frais
Chair ferme

Variété de longue conservation à chair ferme, adaptée à la culture biologique.

- **Excellentes qualités culinaires**
- **Bonne aptitude au stockage**
- **Tolérance au mildiou du tubercule**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Croisement : BINTJE x QUARTA
Numéro de clone : SW 80-0540
Droits d'obtenteur : Expiré

Variété disponible en agriculture biologique.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 6
Couleur du germe : bleu violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : très élevé / 4
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6,5
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : assez élevée / 7
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6,5
Dormance : assez longue / 7

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6
Coups bleus : peu sensible / 7
Crevasses : assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte : sensible / 5,5
Éthylène : - / -

Poids sous eau : 369
Matière sèche : 20,2%
Type de cuisson : ferme / A
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6
Grisaillement : très sensible / 4
Fritabilité : assez mauvaise / 5,5
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : mauvaise / 4

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard - 10%.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard.

Préparation des plants
Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement. Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 49 000 pieds/ha
35/45 mm : 43 000 pieds/ha
45/50 mm : 37 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

desmazieres.fr/ditta

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

Résistances
Mildiou du feuillage : sensible / 5,5
Mildiou du tubercule : peu sensible / 7

Gale commune : peu sensible / 6
Gale poudreuse : peu sensible / 6,5
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : peu sensible / 7
Dartrose : peu sensible / 6
Virus du mop top : sensible / 5

Virus - Enroulement : peu sensible / 7
Virus - A : peu à pas sensible / 9
Virus - X : peu à pas sensible / 8
Virus - Yn : peu sensible / 7,5
Virus - Yntn : sensible / 5

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.



Gourmandine

Frais
Chair ferme

Variété chair ferme de belle présentation et de très longue conservation.

- **Adaptée à différents terroirs**
- **Belle présentation**
- **Bonne aptitude au stockage**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Bretagne Plants
Croisement : CHARLOTTE x ESTIMA
Numéro de clone : 92 F 229-11
Droits d'obtenteur : 31-12-2032

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 7
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : violette
Nombre de baies : moyen / 6
Feuillage - développement initial : moyen / 6
Feuillage - développement final : moyen / 7
Feuillage - épuration : normale / 6
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : assez régulière / 6,5
Tubérisation : assez élevée / 7
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6,5
Dormance : longue / 8

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : peu sensible / 7
Crevasses : peu sensible / 7
Endommagement à la récolte : peu sensible / 7
Éthylène : 5% à 15% de tubercules en plus / 6

Poids sous eau : 354
Matière sèche : 19,4%
Type de cuisson : ferme / A
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6
Grisaillement : assez sensible / 6
Fritabilité : moyenne / 6
Répartition de la matière sèche : excellente / 8
Chipabilité : mauvaise / 4

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard + 10%.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard.

Préparation des plants
Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre. Plantez de préférence les tubercules dans un sol réchauffé car le démarrage de cette variété est lent. Un court choc thermique ou une pré-germination sont recommandés.

Densité de plantation
28/32 mm : 65 000 pieds/ha
32/35 mm : 60 000 pieds/ha
35/45 mm : 52 000 pieds/ha
45/50 mm : 44 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à stockage à long terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/gourmandine

Résistances
Mildiou du feuillage : très sensible / 4,5
Mildiou du tubercule : peu sensible / 6

Gale commune : très sensible / 4,5
Gale poudreuse : peu sensible / 6,5
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : très sensible / 4
Dartrose : sensible / 5
Virus du mop top : peu sensible / 6

Virus - Enroulement : peu sensible / 6
Virus - A : peu à pas sensible / 9
Virus - X : très sensible / 4
Virus - Yn : peu sensible / 6
Virus - Yntn : peu sensible / 6

Nématode doré Ro 1/4 : - / -
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -



Rousseau.

Frais
Chair ferme

Variété chair ferme à peau rouge, belle forme et calibre très homogène.

- **Chair jaune beurre**
- **Jolie peau**
- **Adaptée à la majorité des terroirs**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Lantmännen Seed B.V.
Croisement : CECILE x ROSAGOLD
Numéro de clone : SW 08-0012
Droits d'obtenteur : 31-12-2049

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 6,5
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : violette
Nombre de baies : moyen / 6
Feuillage - développement initial : rapide / 8
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : plutôt facile / 7
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : rouge
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : élevée / 8
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6,5
Dormance : moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse : sensible / 5,5
Coups bleus : peu sensible / 7,5
Crevasses : peu sensible / 7
Endommagement à la récolte : peu sensible / 7,5
Éthylène : 5% de tubercules en moins / 4

Poids sous eau : 378
Matière sèche : 20,6%
Type de cuisson : assez ferme / AB
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7
Grisaillement : sensible / 5
Fritabilité : mauvaise / 4,5
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : mauvaise / 4

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 20%.

Préparation des plants
Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement. Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 57 000 pieds/ha
35/45 mm : 50 000 pieds/ha
45/50 mm : 42 000 pieds/ha
50/55 mm : 37 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à stockage à moyen terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/rousseau

Résistances
Mildiou du feuillage : très sensible / 4,5
Mildiou du tubercule : sensible / 5

Gale commune : peu sensible / 6
Gale poudreuse : peu sensible / 6,5
Fusariose : peu sensible / 6,5
Erwinia : - / -
Dartrose : peu à pas sensible / 8
Virus du mop top : très sensible / 4,5

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : - / -
Virus - Yn : peu sensible / 7,5
Virus - Yntn : peu sensible / 6

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.







INDUSTRIE
FRITES

Des variétés répondant aux exigences du process industriel de la frite : matière sèche, taux de sucre, qualité de conservation et de transformation.

Anosta.

Industrie
Frites

Variété précoce de bon rendement, destinée à la transformation en début de saison.

- **Tubercules de gros calibres**
- **Forte teneur en matière sèche**
- **Très peu sensible aux endommagements à la récolte**



Caractéristiques générales

Obtenteur : L. Stol
Croisement : OSTARA x PROVITA
Numéro de clone : ST 64-65
Droits d'obtenteur : Expiré

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 7
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : très élevé / 4
Feuillage - développement initial : rapide / 8
Feuillage - développement final : moyen / 7
Feuillage - épuration : plutôt facile / 7
Feuillage - tenue : moyenne / 6

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune pâle / 5,5
Finition de la peau : moyenne / 6
Forme du tubercule : oblong rond
Régularité de la forme : assez régulière / 6,5
Tubérisation : assez élevée / 7
Taille du tubercule : assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille : assez irrégulière / 5,5
Dormance : moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse : peu sensible / 7
Coups bleus : peu sensible / 7
Crevasses : peu à pas sensible / 8
Endommagement à la récolte : peu sensible / 7
Éthylène : - / -

Poids sous eau : 390
Matière sèche : 21,2%
Type de cuisson : plutôt farineuse / BC
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7
Grisaillement : - / -
Fritabilité : bonne / 7
Répartition de la matière sèche : - / -
Chipabilité : moyenne / 6

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard.

Préparation des plants
Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation. Un troisième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 45 000 pieds/ha
35/50 mm : 37 000 pieds/ha
50/55 mm : 31 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
Pour conserver la qualité de friture, ne pas stocker en dessous de 7 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.

desmazieres.fr/anosta

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.


Résistances
Mildiou du feuillage : sensible / 5
Mildiou du tubercule : peu à pas sensible / 8

Gale commune : sensible / 5
Gale poudreuse : très sensible / 4
Fusariose : sensible / 5
Erwinia : sensible / 5
Dartrose : - / -
Virus du mop top : peu à pas sensible / 8

Virus - A : peu à pas sensible / 9
Virus - X : sensible / 5,5
Virus - Yn : sensible / 5,5
Virus - Yntn : peu sensible / 7

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.




Armedi.

Industrie
Frites

Variété de conservation précoce, adaptée à la fabrication de frites.

- **Tubérisation élevée**
- **Adaptée au stockage à long terme**
- **Résistances multiples aux nématodes à kyste de la pomme de terre**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : OSTARA x PROVITA
Numéro de clone : AR 10-2432
Droits d'obtenteur : 31-12-2051

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 5,5
Couleur du germe : - / -
Couleur de la fleur : violette / P
Nombre de baies : moyen / 6
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6,5
Feuillage - tenue : ferme / 8

Couleur de la peau : jaune / Y
Couleur de la chair : jaune beurre / 6
Finition de la peau : moyenne / 6
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : moyenne / 6,5
Taille du tubercule : assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6,5
Dormance : moyenne / 6,5

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6
Coups bleus : assez sensible / 6,5
Crevasses : peu sensible / 7
Endommagement à la récolte : très sensible / 4,5
Éthylène : 5% à 15% de tubercules en plus / 6

Poids sous eau : 402
Matière sèche : 21,8%
Type de cuisson : farineuse / C
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7
Grisaillement : assez sensible / 6,5
Fritabilité : excelente / 8
Répartition de la matière sèche : moyenne / 6,5
Chipabilité : bonne / 7

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard + 10%.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 25%.

Préparation des plants
Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation.

Densité de plantation
28/35 mm : 45 000 pieds/ha
35/50 mm : 37 000 pieds/ha
50/55 mm : 31 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, n'utilisez pas de métribuzine, car elle peut provoquer une forte réaction du feuillage et une considérable réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
Pour conserver la qualité de friture, ne pas stocker en dessous de 7 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à long terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/armedi

Résistances
Mildiou du feuillage : très sensible / 4
Mildiou du tubercule : peu sensible / 7,5

Gale commune : sensible / 5,5
Gale poudreuse : sensible / 5,5
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : - / -
Dartrose : sensible / 5,5
Virus du mop top : peu sensible / 7,5

Virus - A : - / -
Virus - X : - / -
Virus - Yn : très sensible / 4,5
Virus - Yntn : - / -

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : assez résistante / 7
Nématode blanc Pa 2 : résistante / 9
Nématode blanc Pa 3 : assez résistante / 8

Une culture pomme de terre.



Fontane.

Industrie
Frites, Chips, flocons

Variété de conservation, très productive, pour la production de frites, de chips et de flocons.

- **Bonne conservation**
- **Forte teneur en matière sèche**
- **Convient à divers terroirs**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Lantmännen Seed B.V.
Croisement : AGRIA x AR 76-034-03
Numéro de clone : SW 87-1140
Droits d'obtenteur : 31-12-2028

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 5,5
Couleur du germe : bleu violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : assez élevé / 5
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final : moyen / 7
Feuillage - épuration : normale / 6
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : assez terne / 5
Forme du tubercule : oblong
Régularité de la forme : assez régulière / 6,5
Tubérisation : assez élevée / 7
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6
Dormance : assez courte / 5,5

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6
Coups bleus : assez sensible / 6
Crevasses : assez sensible / 6
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6
Éthylène : 15% à 25% de tubercules en plus / 7

Poids sous eau : 430
Matière sèche : 23,2%
Type de cuisson : plutôt farineuse / BC
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6,5
Grisaillement : sensible / 5,5
Fritabilité : très bonne / 7,5
Répartition de la matière sèche : moyenne / 6,5
Chipabilité : moyenne / 6

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard + 30%. Il est possible d'utiliser du fumier.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 10%.

Préparation des plants
Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement. Un troisième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 48 000 pieds/ha
35/50 mm : 40 000 pieds/ha
50/55 mm : 35 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à stockage à long terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/fontane

Résistances
Mildiou du feuillage : sensible / 5
Mildiou du tubercule : peu sensible / 6,5

Gale commune : peu sensible / 6
Gale poudreuse : peu sensible / 6
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : peu sensible / 6
Dartrose : - / -
Virus du mop top : peu sensible / 6,5

Virus - Enroulement : peu sensible / 6
Virus - A : - / -
Virus - X : peu sensible / 7
Virus - Yn : sensible / 5,5
Virus - Yntn : peu sensible / 7

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -



Leonore.

Industrie
Frites, chips

Variété précoce faisant rapidement un bon rendement et un bon taux de matière sèche.

- **Fritable tôt en saison**
- **Bonne résistance aux virus**
- **Tubercules oblongs longs avec une belle présentation**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : EXCELLENCY x AR 06-3754
Numéro de clone : SI 85-0482
Droits d'obtenteur : 31-12-2027

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : hâtive / 7,5
Couleur du germe : - / -
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : très forte / 8
Feuillage - développement initial : rapide / 8
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6,5
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune / 7
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong rond
Régularité de la forme : assez régulière / 6
Tubérisation : moyenne / 6,5
Taille du tubercule : assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille : assez régulière / 7
Dormance : moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : peu à pas sensible / 8
Crevasses : assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6,5
Éthylène : 5% de tubercules en plus ou en moins / 5

Poids sous eau : 397
Matière sèche : 21,5 %
Type de cuisson : plutôt farineuse / BC
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7
Grisaillement : très sensible / 4,5
Fritabilité : bonne / 7
Répartition de la matière sèche : bonne / 7,5
Chipabilité : - / -



ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard + 10%.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard.

Préparation des plants
Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 47 000 pieds/ha
35/50 mm : 37 000 pieds/ha
50/55 mm : 32 000 pieds/ha
Plantez Leonore un peu plus profondément que les autres variétés pour éviter que les tubercules ne verdissent.

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
En raison de ses caractéristiques variétales aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 7 °C.
Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/leonore

Résistances
Mildiou du feuillage : très sensible / 3,5
Mildiou du tubercule : sensible / 5

Gale commune : peu sensible / 6
Gale poudreuse : très sensible / 3
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : - / -
Dartrose : sensible / 5
Virus du mop top : sensible / 5,5

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : - / -
Virus - Yn : peu sensible / 7,5
Virus - Yntn : peu sensible / 6

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.

Lugano.

Industrie
Frites, chips

Variété précoce de conservation à chair jaune, destinée à la transformation avec de bonnes résistances aux nématodes à kyste de la pomme de terre.

- **Gros tubercules**
- **Résistances multiples**
- **Bonne aptitude au stockage**



Caractéristiques générales

Obtenteur : F.J. Vos
Croisement : AR 00-2211 x AR 99-0669
Numéro de clone : VO 07-0289
Droits d'obtenteur : 31-12-2048

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 7
Couleur du germe : rouge
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : assez faible / 7
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : plutôt facile / 7
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7,5

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : moyenne / 6
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : assez régulière / 6
Tubérisation : assez faible / 5
Taille du tubercule : gros / 8
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : longue / 8

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6
Coups bleus : assez sensible / 6
Crevasses : assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte : très sensible / 4,5
Éthylène : 5% à 15% de tubercules en plus / 6

Poids sous eau : 394
Matière sèche : 21,4 %
Type de cuisson : légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson : assez ensible / 6,5
Grisaillement : assez sensible / 6
Fritabilité : bonne / 7
Répartition de la matière sèche : bonne / 7,5
Chipabilité : assez mauvaise / 5,5

Résistances

Mildiou du feuillage : sensible / 5
Mildiou du tubercule : sensible / 5,5

Gale commune : sensible / 5,5
Gale poudreuse : peu sensible / 7,5
Fusariose : peu sensible / 6,5
Erwinia : - / -
Dartrose : peu sensible / 6
Virus du mop top : sensible / 5,5

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 20%.

Préparation des plants
Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court choc thermique. Un troisième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 : 60 000 pieds/ha
35/50 : 48 000 pieds/ha
50/55 : 40 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Fongicides
Un programme de pulvérisation préventif contre le mildiou est conseillé.

Récolte
En raison de ses caractéristiques variétales aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à un stockage à long terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/lugano

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : - / -
Virus - Yn : sensible / 5,5
Virus - Yntn : peu sensible / 7,5

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : résistante / 9
Nématode blanc Pa 2 : résistante / 9
Nématode blanc Pa 3 : résistante / 9





Édouard VERMERSCH
Responsable Développement Variétal et Technique

“Lugano produit de gros tubercules longs qui possèdent toutes les propriétés nécessaires à un bon stockage et à une transformation optimale en frites de qualité. Sur le plan agronomique, tout doit être mis en œuvre pour obtenir le plus grand nombre possible de tubercules par hectare. Une bonne préparation du sol, un plant réchauffé (avec, si possible, levée de la dominance apicale), une densité de plantation élevée et un apport adapté en phosphore lors de la tubérisation assureront un potentiel de rendement très élevé. Les tubercules étant gros et allongés, les apports en potasse et le soin porté à la récolte garantiront une production de qualité.”

Markies.

Industrie
Frites, chips

Variété tardive à haut rendement pour la transformation en frites et en chips.

- **Gros tubercules**
- **Résistance au stress hydrique**
- **Bonne aptitude au stockage**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Croisement : FIANNA x AGRIA
Numéro de clone : MA 85-0698
Droits d'obtenteur : 31-12-2029

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : tardive / 4
Couleur du germe : bleu violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : assez faible / 6,5
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6,5
Feuillage - tenue : ferme / 8

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : lisse / 7
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : moyenne / 6
Taille du tubercule : assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : moyenne / 6,5

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6
Coups bleus : peu à pas sensible / 8
Crevasses : peu sensible / 7
Endommagement à la récolte : sensible / 5
Éthylène : 5% à 15% de tubercules en plus / 6

Poids sous eau : 427
Matière sèche : 22,8%
Type de cuisson : plutôt farineuse / BC
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6
Grisaillement : peu sensible / 7
Fritabilité : excellente / 8
Répartition de la matière sèche : bonne / 7,5
Chipabilité : bonne / 7

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard - 10%. De préférence en trois apports, dont le deuxième doit avoir lieu peu après la tubérisation.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 10%.

Préparation des plants
Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe apical du dessus peut accroître la tubérisation.

Densité de plantation
28/35 mm : 48 000 pieds/ha
35/50 mm : 40 000 pieds/ha
50/55 mm : 33 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Fongicides
Un programme de pulvérisation préventif contre le mildiou est conseillé.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/markies

Résistances
Mildiou du feuillage : peu sensible / 6,5
Mildiou du tubercule : peu sensible / 7

Gale commune : sensible / 5
Gale poudreuse : très sensible / 3,5
Fusariose : peu à pas sensible / 8
Erwinia : sensible / 5
Dartrose : - / -
Virus du mop top : très sensible / 4

Virus - Enroulement : peu sensible / 7
Virus - A : peu à pas sensible / 8
Virus - X : peu à pas sensible / 8
Virus - Yn : peu sensible / 7,5
Virus - Yntn : peu sensible / 7

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -



Sidney.

Industrie
Frites, chips

Variété à haut rendement pour une récolte précoce destinée à la transformation en frites et en chips.

- **Productivité régulière**
- **Bonne teneur en matière sèche**
- **Tubercules homogènes**



Caractéristiques générales

Obtenteur : J. Schilt
Croisement : AGRIA x AM 70-2166
Numéro de clone : SI 85-0482
Droits d'obtenteur : 31-12-2027

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 7
Couleur du germe : bleu violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : très élevé / 4
Feuillage - développement initial : rapide / 8
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : plutôt facile / 7
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7,5

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : moyenne / 6
Forme du tubercule : oblong rond
Régularité de la forme : assez régulière / 6
Tubérisation : assez élevée / 7
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : assez sensible / 6,5
Crevasses : assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte : très sensible / 4,5
Éthylène : - / -

Poids sous eau : 416
Matière sèche : 22,6%
Type de cuisson : légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson : sensible / 5
Grisaillement : sensible / 5
Fritabilité : très bonne / 7,5
Répartition de la matière sèche : bonne / 7
Chipabilité : bonne / 7

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard. L'utilisation d'azote organique est déconseillée. Optimiser une disponibilité précoce.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 10%.

Préparation des plants
Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation. Un troisième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 47 000 pieds/ha
35/50 mm : 37 000 pieds/ha
50/55 mm : 32 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/sidney

Résistances
Mildiou du feuillage : très sensible / 4,5
Mildiou du tubercule : sensible / 5

Gale commune : sensible / 5,5
Gale poudreuse : sensible / 5
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : peu sensible / 6
Dartrose : - / -
Virus du mop top : peu sensible / 6

Virus - Enroulement : peu sensible / 6
Virus - A : - / -
Virus - X : peu à pas sensible / 8,5
Virus - Yn : peu sensible / 7
Virus - Yntn : peu sensible / 7

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : sensible / 4
Nématode blanc Pa 3 : sensible / 2

Une culture pomme de terre.



Sinora.

Industrie
Frites, Chips, flocons

Variété à haut rendement pour une récolte précoce destinée à la transformation en frites, en chips et en flocons.

- **Productivité régulière**
- **Bonne teneur en matière sèche**
- **Tubercules homogènes**



Caractéristiques générales

Obtenteur : J. Schilt
Croisement : AGRIA x AM 70-2166
Numéro de clone : SI 85-0482
Droits d'obtenteur : 31-12-2027

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 7
Couleur du germe : bleu violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : très élevé / 4
Feuillage - développement initial : rapide / 8
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : plutôt facile / 7
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7,5

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : moyenne / 6
Forme du tubercule : oblong rond
Régularité de la forme : assez régulière / 6
Tubérisation : assez élevée / 7
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : assez sensible / 6,5
Crevasses : assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte : très sensible / 4,5
Éthylène : - / -

Poids sous eau : 416
Matière sèche : 22,6%
Type de cuisson : légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson : sensible / 5
Grisaillement : sensible / 5
Fritabilité : très bonne / 7,5
Répartition de la matière sèche : bonne / 7
Chipabilité : bonne / 7

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard + 25%. L'utilisation d'azote organique est déconseillée.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 10%.

Préparation des plants
Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation. Un troisième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 47 000 pieds/ha
35/50 mm : 37 000 pieds/ha
50/55 mm : 32 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation
La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/sinora

Résistances
Mildiou du feuillage : très sensible / 4,5
Mildiou du tubercule : sensible / 5

Gale commune : sensible / 5,5
Gale poudreuse : sensible / 5
Fusariose : peu sensible / 6
Erwinia : peu sensible / 6
Dartrose : - / -
Virus du mop top : peu sensible / 6

Virus - Enroulement : peu sensible / 6
Virus - A : - / -
Virus - X : peu à pas sensible / 8,5
Virus - Yn : peu sensible / 7
Virus - Yntn : peu sensible / 7

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : sensible / 4
Nématode blanc Pa 3 : sensible / 2

Une culture pomme de terre.







INDUSTRIE
CHIPS

Des variétés spécifiquement sélectionnées pour la production de chips, avec un haut niveau d'exigence sur la matière sèche, le taux de sucre et la qualité de process.

Beyonce.

Industrie
Chips, flocons

Variété adaptée à la transformation en chips, stockage à moyen terme et résistante au mildiou du feuillage et du tubercule.

- **Tubercules très homogènes**
- **Bonne dormance**
- **Résistante au mildiou feuillage et tubercules**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : AR 94-2061 x LADY JO
Numéro de clone : AR 08-3271
Droits d'obtenteur : 31-12-2049

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 6
Couleur du germe : bleu violet
Couleur de la fleur : violette
Nombre de baies : très élevé / 4
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6,5
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7,5

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : plutôt moyenne / 5,5
Forme du tubercule : oblong rond
Régularité de la forme : assez régulière / 6,5
Tubérisation : assez élevée / 7
Taille du tubercule : assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : assez longue / 7

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6
Coups bleus : peu sensible / 7,5
Crevasses : assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6
Éthylène : 5% de tubercules en plus ou en moins / 5

Poids sous eau : 446
Matière sèche : 23,9%
Type de cuisson : plutôt farineuse / BC
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7
Grisaillement : peu à pas sensible / 8
Fritabilité : bonne / 7
Répartition de la matière sèche : moyenne / 6,5
Chipabilité : excellente / 8

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 25%.

Préparation des plants
Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement. Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 50 000 pieds/ha
35/50 mm : 45 000 pieds/ha
50/55 mm : 40 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Fongicides
Malgré sa résistance au mildiou, surveillez le risque d'infection.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
Pour conserver la qualité de friture, ne pas stocker en dessous de 9 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/beyonce

Résistances
Mildiou du feuillage : peu à pas sensible / 8,5
Mildiou du tubercule : peu sensible / 7,5

Gale commune : sensible / 5,5
Gale poudreuse : peu sensible / 6
Fusariose : peu sensible / 7,5
Erwinia : - / -
Dartrose : peu sensible / 7,5
Virus du mop top : peu sensible / 6

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : - / -
Virus - Yn : sensible / 5,5
Virus - Yntn : sensible / 5

Nématode doré Ro 1/4 : sensible / 4
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.



Chester.

Industrie
Chips, flocons

Variété demi-hâtive résistante au *Globodera pallida*, aux tubercules homogènes, avec une bonne matière sèche et une bonne tolérance aux coups bleus.

- **Haut rendement et bonne tubérisation**
- **Bonne qualité de friture, même après une longue période de stockage**
- **Convient aux flocons**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : AR 07-4052 x ALICANTE
Numéro de clone : AR 13-2694
Droits d'obtenteur : en attente

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 6
Couleur de la fleur : blanche
Couleur du germe : -
Nombre de baies : - / -
Feuillage - développement initial : rapide / 8
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7,5
Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : assez terne / 5
Forme du tubercule : oblong rond
Régularité de la forme : assez régulière / 6,5
Tubérisation : moyenne / 6,5
Taille du tubercule : assez gros / 7
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6,5
Dormance : assez courte / 5

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6
Coups bleus : peu sensible / 7,5
Crevasses : peu sensible / 7
Endommagement à la récolte : sensible / 5
Éthylène : 5% à 15% de tubercules en plus / 6

Poids sous eau : 446
Matière sèche : 24 %
Type de cuisson : farineuse / C
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7
Grisaillement : très sensible / 4,5
Fritabilité : - / -
Répartition de la matière sèche : moyenne / 6
Chipabilité : bonne / 7

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 10%.

Préparation des plants
Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court choc thermique. Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation
28/35 mm : 54 000 pieds/ha
35/50 mm : 45 000 pieds/ha
50/55 mm : 33 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine
ne provoque pas de réaction du feuillage ni de
réduction du rendement.

Fongicides
Un programme de pulvérisation préventif contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
En raison de ses caractéristiques variétales aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

Conservation
Pour conserver la qualité de transformation, ne pas stocker en dessous de 9 °C. Convient à un stockage de moyen terme.

desmazieres.fr/chester

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

Résistances
Mildiou du feuillage : sensible / 5
Mildiou du tubercule : sensible / 5,5

Gale commune : sensible / 5,5
Gale poudreuse : - / -
Fusariose : - / -
Erwinia : - / -
Dartrose : - / -
Virus du mop top : sensible / 5

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : - / -
Virus - Yn : peu sensible / 6
Virus - Yntn : peu à pas sensible / 8

Nématode doré Ro 1/4 : moyennement sensible* / 5*
Nématode doré Ro 2/3 : moyennement sensible / 5
Nématode blanc Pa 2 : assez résistante* / 7*
Nématode blanc Pa 3 : assez résistante* / 7*

Une culture pomme de terre.



Corsica.

Industrie
Chips

Variété ayant une très bonne conservation, destinée à la transformation en chips.

- **Bon rendement**
- **Bonne aptitude au stockage**
- **Tubercules de taille très uniforme**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : LADY CLAIR x ARG 96-0865
Numéro de clone : AR 05-1887
Droits d'obtenteur : 31-12-2046

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 5,5
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : très élevé / 4
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : plutôt facile / 7
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7,5

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : plutôt moyenne / 5,5
Forme du tubercule : oblong rond
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : assez élevée / 7
Taille du tubercule : assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : assez longue / 7

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6
Coups bleus : peu sensible / 7
Crevasses : assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6
Éthylène : 15% à 25% de tubercules en plus / 7

Poids sous eau : 441
Matière sèche : 23,7%
Type de cuisson : farineuse / C
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6
Grisaillement : sensible / 5
Fritabilité : moyenne / 6
Répartition de la matière sèche : moyenne / 6,5
Chipabilité : excellente / 8

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard - 10%.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard.

Préparation des plants
Une période de réchauffement ou pré-germination est recommandée. Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation. Dégermer une fois est optionnel.

Densité de plantation
28/35 mm : 50 000 pieds/ha
35/50 mm : 42 000 pieds/ha
50/55 mm : 35 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Fongicides
Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation
En vue de leur utilisation, ne stockez pas les tubercules en dessous de 9 °C. Convient à un stockage à long terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/corsica

Résistances
Mildiou du feuillage : sensible / 5,5
Mildiou du tubercule : peu sensible / 6,5

Gale commune : peu sensible / 7
Gale poudreuse : très sensible / 4,5
Fusariose : peu sensible / 7
Erwinia : - / -
Dartrose : sensible / 5,5
Virus du mop top : très sensible / 4

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : - / -
Virus - Yn : peu sensible / 6
Virus - Yntn : sensible / 5,5

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : - / -
Nématode blanc Pa 3 : - / -

Une culture pomme de terre.



Napoleon.

Industrie
Chips, flocons

Variété de conservation aux calibres homogènes et à la teneur en matière sèche élevée.

- **Bonne aptitude à la transformation en chips**
- **Convient à la transformation en flocons**
- **Bonne résistance aux virus**



Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : ANTINA x ALICANTE
Numéro de clone : AR 10-4637
Droits d'obtenteur : 31-12-2051

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : tardive / 5
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : très élevé / 4
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6,5
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7,5

Couleur de la peau : jaune
Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Finition de la peau : assez terne / 5
Forme du tubercule : oblong rond
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : moyenne / 6
Taille du tubercule : assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille : régulière / 7
Dormance : moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse : assez sensible / 6,5
Coups bleus : sensible / 5,5
Crevasses : assez sensible / 6

Endommagement à la récolte : très sensible / 4,5
Éthylène : 5% de tubercules en plus ou en moins / 5

Poids sous eau : 450
Matière sèche : 24,1%
Type de cuisson : plutôt farineuse / BC
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6
Grisaillement : assez sensible / 6
Fritabilité : bonne / 7
Répartition de la matière sèche : bonne / 7
Chipabilité : excellente / 8

Résistances

Mildiou du feuillage : peu sensible / 6
Mildiou du tubercule : peu sensible / 6,5

Gale commune : peu sensible / 6
Gale poudreuse : - / -
Fusariose : peu sensible / 6,5
Erwinia : - / -
Dartrose : peu sensible / 6
Virus du mop top : sensible / 5

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation[1]
Azote : conseil standard - 10%.
L'utilisation d'azote organique est déconseillée.
Phosphore : conseil standard.
Potasse : conseil standard + 20%.

Préparation des plants
Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation.

Densité de plantation
28/35 mm : 54 000 pieds/ha
35/50 mm : 45 000 pieds/ha
50/55 mm : 33 000 pieds/ha

Désherbage[2]
Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Fongicides
Un programme de pulvérisation préventif contre le mildiou est conseillé.

Récolte
Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation
Pour conserver la qualité de transformation, ne pas stocker en dessous de 9 °C. Convient à un stockage de moyen à long terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.
[2] Ces notations sont issues de nos essais internes.

desmazieres.fr/napoleon

Virus - Enroulement : - / -
Virus - A : - / -
Virus - X : - / -
Virus - Yn : peu à pas sensible / 8
Virus - Yntn : peu à pas sensible / 8

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3 : - / -
Nématode blanc Pa 2 : sensible / 4
Nématode blanc Pa 3 : sensible / 2





Édouard VERMERSCH
Responsable Développement Variétal et Technique

“Dans la continuité de Corsica et de Beyonce, Napoleon complète notre gamme de variétés destinées à la transformation en chips. Assez rapidement après la plantation, Napoleon développe un très gros feuillage lui permettant d'exprimer son bon potentiel de rendement dans de nombreuses conditions pédoclimatiques. Cette bonne productivité en tubercules oblongs courts se caractérise par une homogénéité de calibre exceptionnelle. La matière sèche est élevée et sa répartition dans les tubercules est excellente ; associées à une bonne dormance et une capacité à être conservé à température relativement basse, ces caractéristiques permettent à Napoleon de répondre aux exigences du marché de la pomme de terre de longue conservation pour la transformation en chips.”

Une sélection de variétés **adaptée pour la production biologique**

Depuis près de trois décennies, Desmazières accompagne l'agriculture biologique en développant des variétés pensées pour répondre aux exigences de ce mode de production.

Acteur historique et leader sur le marché du plant biologique, nous plaçons la tolérance et le renforcement des défenses naturelles des plantes au cœur de notre travail de sélection. En collaboration avec Agrico, nous proposons une gamme de 9 variétés, permettant de répondre aux exigences environnementales et réglementaires et faire de la proximité avec nos producteurs bio, l'un des axes forts de notre accompagnement. ■



AGRICULTURE BIOLOGIQUE

CHAIR FERME

Ditta.



- Excellentes qualités culinaires
- Tolérance au mildiou du tubercule
- Bonne aptitude au stockage

En savoir plus page 54



FOUR, PURÉE, POTAGE

Alouette.



- Tubercules réguliers et homogènes
- Bonne tolérance aux endommagements
- Bonne tolérance à la sécheresse

En savoir plus page 10

Ecrin.



- Tubercules réguliers, peau claire
- Bonne résistance à la gale commune
- Adaptée à une longue conservation

En savoir plus page 18

Levante.



- Très belle peau, lisse et claire
- Tubérisation élevée
- Bonne aptitude au stockage

En savoir plus page 22

Twister.



- Tubercules de gros calibres à peau claire
- Excellente productivité
- Bonne aptitude au stockage

En savoir plus page 28

FRITES

Babylon.



- **Tubercules de gros calibres à chair jaune**
- **Rendement élevé**
- **Excellente capacité de stockage**

En savoir plus page 38

Twinner.




- **Tubercules oblongs réguliers**
- **Production précoce, résistante au mildiou**
- **Bonne fritabilité tôt en saison**

En savoir plus page 48



Explorez notre boutique en ligne

Découvrez notre sélection de plant de pommes de terre biologiques, disponible sur notre site marchand



Chaque année, entre mi-novembre et fin avril, vous pouvez commander nos variétés biologiques directement depuis notre site.

Commander n'a jamais été aussi simple : découvrez nos différentes variétés, sélectionnez celles qui vous conviennent et finalisez votre achat en quelques clics.

Notre plateforme vous garantit une expérience rapide, sécurisée et accompagnée par nos experts, disponibles par téléphone pour vous conseiller si besoin.

Visitez notre boutique en ligne sans attendre !

Achetez en ligne dès maintenant

boutique.desmazieres.fr

Notes.

Variétés	Page	Variétés biologiques	Segment de marché		Caractéristiques		
					Maturité	Couleur de la peau	Couleur de la chair
FOUR, PURÉE, POTAGE							
Agata	8		Four, purée, potage		8	Y	6
Alouette	10	Biologique	Four, purée, potage	4ème gamme	6	R	7,5
Amaez	12		Four, purée, potage		5,5	Y	6
Arizona	14		Four, purée, potage		6,5	Y	6
Constance	16		Four, purée, potage		7	Y	6,5
Ecrin	18	Biologique	Four, purée, potage		6	Y	5,5
Esmee	20		Four, purée, potage		6,5	R	7
Levante	22	Biologique	Four, purée, potage		5,5	Y	6
Manitou	24		Four, purée, potage		5	R	6
Montana	26		Four, purée, potage		6	Y	6,5
Twister	28	Biologique	Four, purée, potage		7	Y	6,5
Vogue	30		Four, purée, potage		6,5	Y	7
FRITES MÉNAGÈRES							
Artemis	34		Frites ménagères, four, purée, potage		7	Y	6
Auriera	36		Frites ménagères		6	Y	6
Babylon	38	Biologique	Frites ménagères	Frites, chips, 4ème gamme	5	Y	7
Excellency	40		Frites ménagères		6,5	Y	6
Jolene	42		Frites ménagères		6	Y	6
Rudolph	44			Frites	5,5	R	4
Tresor	46		Frites ménagères, four, purée, potage		7,5	Y	5,5
Twinner	48	Biologique	Frites ménagères		7,5	Y	7

					Résistances					
Forme du tubercule	Matière sèche	Type de cuisson	Chipabilité	Fritabilité	Mildiou du tubercule	Mildiou du feuillage	Ro 1/4	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3
O	17,6	AB	4	4	6	5	9	-	-	-
OL	21,1	AB	-	6,5	9	9	9	8	-	-
O	18,7	AB	5	6	6	6	9	1	1	1
O	17	AB	4	4	5	4	9	-	-	-
OR	19,7	AB	4	5,5	4,5	5	9	-	-	-
LO	19,2	AB	5	6	5	6	9	-	-	-
OL	18	AB	4	6	7	4,5	9	-	-	-
LO	19,9	B	4,5	5,5	7,5	8,5	9	-	-	-
LO	19,4	B	4,5	5,5	6	5	9	-	4	2
O	18,5	AB	5	5,5	6	5	9	-	-	-
RO	19	AB	4	5	9	9	9	6	7	5
OL	17,3	AB	4	5	6	4	-	-	5	2
OL	20,4	B	6	6	8	5	-	-	-	-
OR	20,1	B	6	7	7	6	8	-	-	-
OL	21,7	BC	7	8	6,5	5,5	4	-	-	-
OL	21,6	BC	6	7	5	5	-	-	-	-
OL	21,1	B	5	7	5	4	9	9	-	-
OR	20,5	AB	5,5	6,5	5,5	5,5	9	-	-	-
O	19	B	7	7,5	8	4	9	7	9	8
O	19,7	AB	5	6,5	9	8	-	-	-	-

Variétés	Page	Variétés biologiques	Segment de marché		Caractéristiques		
					Maturité	Couleur de la peau	Couleur de la chair
CHAIR FERME							
Chateau	52		Vapeur		7,5	Y	6,5
Ditta	54	Biologique	Vapeur		6	Y	6,5
Gourmandine	56		Vapeur		7	Y	6,5
Rousseau	58		Vapeur		6,5	R	6,5
FRITES							
Anosta	62			Frites	7	Y	5,5
Armedi	64			Frites	5,5	Y	6
Fontane	66			Frites, Chips, flocons	5,5	Y	6,5
Leonore	68			Frites	7,5	Y	7
Lugano	70			Frites, chips	7	Y	6,5
Markies	72			Frites, chips	4	Y	6,5
Sidney	74			Frites	6	Y	4,5
Sinora	76			Frites, Chips, flocons	7	Y	6,5
CHIPS							
Beyonce	80			Chips, flocons	6	Y	6,5
Chester	82			Chips, flocons	6	Y	6,5
Corsica	84			Chips	5,5	Y	6,5
Napoleon	86			Chips, flocons	5	Y	6,5

					Résistances					
Forme du tubercule	Matière sèche	Type de cuisson	Chipabilité	Fritabilité	Mildiou du tubercule	Mildiou du feuillage	Ro 1/4	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3
LO	19,2	AB	4	4	5,5	4	9	-	-	-
LO	20,2	A	4	5,5	7	5,5	-	-	-	-
LO	19,4	A	4	6	6	4,5	-	-	-	-
LO	20,6	AB	4	4,5	5	4,5	9	-	-	-
OR	21,2	BC	6	7	8	5	9	-	-	-
OL	21,8	C	7	8	7,5	4	9	-	-	-
O	23,2	BC	6	7,5	6,5	5	9	-	-	-
LO	21,5	BC	-	7	5	3,5	9	-	-	-
OL	21,4	B	5,5	7	5,5	5	9	9	9	9
OL	22,8	BC	7	8	7	6,5	8	-	-	-
LO	21,5	B	-	6,5	8	4	9	4	8	6
OR	22,6	B	7	7,5	5	4,5	9	-	4	2
OR	23,9	BC	8	7	7,5	8,5	9	-	-	-
RO	24	C	7	-	5,5	5	5	5	7	7
RO	23,7	C	8	6	6,5	5,5	9	-	-	-
RO	24,1	BC	8	7	6,5	6	9	-	-	-

Segment de marché

frais

• grenailles, frais, vapeur, consommation, frites ménagères

industrie de transformation

• chips, 4ème gamme, flocons, frites, fécule

culture biologique

• frais, vapeur, consommation, frites ménagères

Caractéristiques de la plante et des tubercules



Les variétés marquées de cette estampille sont résistantes au Phytophtora Infestans.

Les variétés marquées de cette estampille présentent une bonne dormance naturelle.



Les variétés marquées de cette estampille sont résistantes à la chaleur et peuvent supporter des apports en eau plus faibles ou plus irréguliers.



Les variétés signés Desmazières sont les symboles de l'excellence et du savoir-faire de Desmazières. Elles incarnent notre héritage et notre engagement pour la qualité, la diversité et l'innovation.

Maturité	4 tardive; 4,5 tardive; 5 tardive; 5,5 demi-tardive; 6 demi tardive; 6,5 demi-hâtive; 7 demi-hâtive; 7,5 hâtive; 8 hâtive; 8,5 très hâtive; 9 très hâtive
Couleur du germe	**B** bleu **G** vert **P** rose **R** rouge **V** violet **L** clair **D** foncé Ainsi que toutes autres combinaisons, par exemple : LBP bleu violet clair ou DRV violet rouge foncé
Couleur de la fleur	**W** blanche **LP** mauve pâle **P** violette **LB** bleue clair **B** bleue **V** violette **DP** mauve foncé **BP** mauve bleuté
Nombre de baies	4 nulle ; 4,5 très faible; 5 faible ; 5,5 assez faible ; 6 moyenne ; 6,5 peu importante ; 7 assez importante ; 7,5 forte ; 8 très forte
Feuillage - développement initial	4 lent; 4,5 lent; 5 plutôt lent; 5,5 plutôt lent; 6 moyen; 6,5 moyen; 7 plutôt rapide; 7,5 plutôt rapide; 8 rapide
Feuillage - développement final	4 faible; 4,5 faible; 5 faible; 5,5 faible; 6 faible; 6,5 moyen; 7 moyen; 7,5 assez bon; 8 bon
Feuillage - épurution	4 très difficile; 4,5 difficile; 5 plutôt difficile; 5,5 plutôt difficile; 6 normale; 6,5 plutôt facile; 7 plutôt facile; 7,5 facile; 8 très facile
Feuillage - tenue	4 très fragile; 4,5 fragile; 5 plutôt fragile; 5,5 plutôt fragile; 6 moyenne; 6,5 plutôt ferme; 7 plutôt ferme; 7,5 plutôt ferme; 8 ferme
Couleur de la chair	4 blanche; 4,5 blanche; 5 jaune pâle; 5,5 jaune pâle; 6 jaune beurre; 6,5 jaune beurre; 7 jaune; 7,5 jaune; 8 jaune safran; 8,5 orange
Couleur de la peau	**Y** jaune **R** rouge **Y/R** jaune avec des yeux rouges **RUS** réticulée **P** violette
Finition de la peau	3 réticulée; 3,5 réticulée; 4 très terne; 4,5 terne; 5 assez terne; 5,5 plutôt moyenne; 6 moyenne; 6,5 assez lisse; 7 lisse; 7,5 très lisse; 8 excellente
Taille du tubercule	4 petit; 4,5 petit; 5 assez petit; 5,5 assez petit; 6 moyen; 6,5 moyen; 7 assez gros; 7,5 assez gros; 8 gros
Forme du tubercule	**R** rond **RO** oblong rond **OR** oblong rond **O** oblong **OL** oblong long **LO** oblong long **L** long
Régularité de la forme	4 irrégulière; 4,5 irrégulière; 5 assez irrégulière; 5,5 assez irrégulière; 6 assez régulière; 6,5 assez régulière; 7 régulière; 7,5 régulière; 8 régulière
Tubérisation	4 faible; 4,5 faible; 5 assez faible; 5,5 assez faible; 6 moyenne; 6,5 moyenne; 7 assez élevée; 7,5 assez élevée; 8 élevée; 8,5 élevée; 9 élevée
Homogénéité de calibre	4 irrégulière; 4,5 irrégulière; 5 assez irrégulière; 5,5 assez irrégulière; 6 assez régulière; 6,5 assez régulière; 7 régulière; 7,5 régulière; 8 très régulière

Sensibilité et qualité

Dormance	4 courte; 4,5 courte; 5 assez courte; 5,5 assez courte; 6 moyenne; 6,5 moyenne; 7 assez longue; 7,5 assez longue; 8 longue
Éthylène*	**4** 5% de tubercules en moins **4,5** 5% de tubercules en moins **5** 5% de tubercules en plus ou en moins **5,5** 5% de tubercules en plus ou en moins **6** 5 à 15% de tubercules en plus **6,5** 5 à 15% de tubercules en plus **7** 15 à 25% de tubercules en plus **7,5** 15 à 25% de tubercules en plus **8** 25% de tubercules en plus
Repousse	4 très sensible; 4,5 très sensible; 5 sensible; 5,5 sensible; 6 assez sensible; 6,5 assez sensible; 7 peu sensible; 7,5 peu sensible; 8 très peu à pas sensible
Crevasses	4 très sensible; 4,5 très sensible; 5 sensible; 5,5 sensible; 6 assez sensible; 6,5 assez sensible; 7 peu sensible; 7,5 peu sensible; 8 peu à pas sensible
Coups bleus	4 très sensible; 4,5 très sensible; 5 sensible; 5,5 sensible; 6 assez sensible; 6,5 assez sensible; 7 peu sensible; 7,5 peu sensible; 8 peu à pas sensible
Endommagement à la récolte	4 très sensible; 4,5 très sensible; 5 sensible; 5,5 sensible; 6 assez sensible; 6,5 assez sensible; 7 peu sensible; 7,5 peu sensible; 8 très peu à pas sensible
Poids sous eau	300 grammes bas, 500 grammes haute
Matière sèche	17% faible; 26,5% elevée
Répartition de la matière sèche	5 plutôt irrégulier; 5,5 plutôt irrégulier; 6 moyen; 6,5 moyen; 7 bon; 7,5 bon; 8 excellent; 8,5 excellent; 9 excellent; 9,5 excellent
Niveau de glyco-alcaloïde	Indique le niveau de TGA (glyco-alcaloïdes) mesuré en mg par 100 grammes.
Chipabilité	4 mauvaise ; 4,5 mauvaise ; 5 mauvaise ; 5,5 moyenne ; 6 moyenne ; 6,5 supérieure à la moyenne ; 7 bonne ; 7,5 très bonne ; 8 excellente
Fritabilité	4 mauvaise ; 4,5 mauvaise ; 5 mauvaise ; 5,5 moyenne ; 6 moyenne ; 6,5 supérieur à la moyenne ; 7 bonne ; 7,5 très bonne ; 8 excellente
Type de cuisson	**A** ferme **AB** assez ferme **B** légèrement farineuse **BC** plutôt farineuse **C** farineuse **CD** très farineuse
Grisaillement	4 très sensible; 4,5 très sensible; 5 sensible; 5,5 sensible; 6 assez sensible; 6,5 assez sensible; 7 peu sensible; 7,5 peu sensible; 8 très peu à pas sensible
Noircissement après cuisson	4 très sensible; 4,5 très sensible; 5 sensible; 5,5 sensible; 6 assez sensible; 6,5 assez sensible; 7 peu sensible; 7,5 peu sensible; 8 très peu à pas sensible

Résistances

Nématodes à kystes des pommes de terre Nématode doré : Ro1, 2, 3 et 4 Nématode blanc : Pa 2 et 3	1 sensible; 2 sensible; 3 sensible; 4 sensible; 5 moyennement sensible; 6 moyennement sensible; 7 assez résistant; 8 assez résistant; 9 résistant * = Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont, pour le moment pas officiels.
Mildiou du feuillage, mildiou du tubercule, gale commune, gale poudreuse, fusariose peu, erwinia, dartrose, virus du mop top, virus enroulement, A, X, Y, Y nécrotique	2 très sensible; 2,5 très sensible; 3 très sensible; 3,5 très sensible; 4 très sensible; 4,5 très sensible; 5 sensible; 5,5 sensible; 6 peu sensible; 6,5 peu sensible; 7 peu sensible; 7,5 peu sensible; 8 peu à pas sensible; 8,5 peu à pas sensible; 9 pas sensible

* L'utilisation de ces matières actives est réglementée par pays. Assurez-vous qu'elle soit autorisée avant toute application.

Desmazières
An Agrico company.

Un portail pensé pour nos échanges

Réservations, commandes, livraisons, factures, réclamations : le portail Desmazières réunit l'ensemble de nos échanges administratifs sur un espace unique, accessible à tout moment.

- **Réservations** variétés & volumes
- **Commandes** suivi en temps réel
- **Livraisons** traçabilité
- **Comptabilité** consultation des factures
- **Réclamations** déclaration & suivi

Un outil développé en interne, qui évolue en continu au plus près de vos besoins.

portail.desmazieres.fr

DESMAZIÈRES
123 allée du Benelux
ZI Artoipôle
62118 MONCHY-LE-PREUX - France
contact@desmazieres.fr
www.desmazieres.fr

Imprimé par SENSEY – Novembre 2026