


Rousseau.



Frais
Vapeur

Rousseau est une pomme de terre à chair ferme à peau rouge, pour salade, avec une belle forme et un calibre très homogène.

- ▶ **Chair jaune beurre**
- ▶ **Jolie peau**
- ▶ **Adaptée à la majorité des terroirs**



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Obtenteur: Lantmännen Seed B.V.
Croisement: CECILE x ROSAGOLD
Droits d'obteneur: 31-12-2049
Code de semis: SW 08-0012

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-hâtive / 6,5
Couleur du germe: rouge violet / RV
Couleur de la fleur: violette / P
Nombre de baies: moyen / 6
Feuillage - développement initial: rapide / 8
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7
Feuillage - facilité d'épuration: plutôt facile / 7
Couleur de la peau: rouge / R
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: lisse / 7
Forme du tubercule: oblong long / LO
Régularité de la forme: régulière / 7
Tubérisation: élevée / 8
Taille du tubercule: assez gros / 7
Homogénéité de la taille: assez régulière / 6,5
Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: sensible / 5,5
Coups bleus: peu sensible / 7,5
Crevasses: peu sensible / 7
Endommagement à la récolte: peu sensible / 7,5
Bentazone: - / -
Éthylène: 5% de tubercules en moins / 4
Poids sous eau: 378
Matière sèche: 20,6%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Noircissement après cuisson: peu sensible / 7
Grisaillement: sensible / 5
Fritabilité: mauvaise / 4,5
Répartition de la matière sèche: - / -
Chipabilité: mauvaise / 4
Niveau de glyco-alcaloïde: 5,9
Huile de menthe: 15% à 25% de tubercules en plus / 7



ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation et traitement du plant ¹

Azote: conseil standard.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard + 20%.

Traitement de semence

Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement. Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Distances de plantation

28/35 mm : 57000 pieds/ha

35/45 mm : 50000 pieds/ha

45/50 mm : 42000 pieds/ha

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à stockage à long terme.



Résistances

Virus - Enroulement: - / -

Virus - Y: peu sensible / 7,5

Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 6

Virus du mop top: très sensible / 4,5

Mildiou du feuillage: très sensible / 4,5

Mildiou du tubercule: sensible / 5

Fusariose: peu sensible / 6,5

Gale commune: peu sensible / 6

Gale poudreuse: peu sensible / 6,5

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Dartrose: peu à pas sensible / 8

Erwinia: - / -

Galle verruqueuse F1: - / -

Galle verruqueuse F6: - / -

Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3: - / -

Nématode blanc Pa 2: - / -

Nématode blanc Pa 3: - / -