Rudolph.

Rudolph est une pomme de terre de conservation à la belle peau rouge et chair blanche et un très bon rendement.

- **Bonne tolérance aux températures élevées**
- **Gros tubercules**
- **Bonne aptitude au stockage**

Industrie
Frites

Frais



Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: CHIEFTAIN x STIRLING
Droits d'obtenteur: 31-12-2035
Code de semis: UK 93-1-2

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur du germe: rouge violet / RV
Couleur de la fleur: mauve pâle / LP
Nombre de baies: moyen / 6
Feuillage - développement initial: moyen / 6
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: ferme / 8
Feuillage - facilité d'épuration: normale / 6,5
Couleur de la peau: rouge / R
Couleur de la chair: blanche / 4
Finition de la peau: lisse / 7
Forme du tubercule: oblong rond / OR
Régularité de la forme: assez régulière / 6
Tubérisation: assez faible / 5
Taille du tubercule: gros / 8
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: assez longue / 7

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
Coups bleus: peu sensible / 7
Crevasses: assez sensible / 6
Endommagement à la récolte: assez sensible / 6
Bentazone: - / -
Éthylène: 5% à 15% de tubercules en plus / 6
Poids sous eau: 376
Matière sèche: 20,5%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Noircissement après cuisson: assez sensible / 6,5
Grisaillement: - / -
Fritabilité: supérieure à la moyenne / 6,5
Répartition de la matière sèche: - / -
Chipabilité: assez mauvaise / 5,5
Niveau de glyco-alcaloïde: 5,5 mg/100g
Huile de menthe: 15% à 25% de tubercules en plus / 7

Desmazières
An Agrico company.

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu toute information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les ommissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable des dommages résultant ou liés aux informations contenues dan ces fiches.

AGRICO

Conseils de culture

Fertilisation et traitement du plant [1]

Azote: conseil standard.Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard + 10%.

Traitement de semence

Une période de réchauffement ou pré-germination est recommandée.Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation.Dégermer une fois est optionnel.

Distances de plantation

28/40 mm : 44000 pieds/ha
40/50 mm : 36000 pieds/ha
50/55 mm : 33000 pieds/ha

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à stockage à long terme.



Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: sensible / 5
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 7
Virus du mop top: peu sensible / 7
Mildiou du feuillage: sensible / 5,5
Mildiou du tubercule: sensible / 5,5
Fusariose: peu sensible / 6
Gale commune: sensible / 5
Gale poudreuse: peu sensible / 7
Virus - A: - / -
Virus - X: peu sensible / 6
Dartrose: peu sensible / 7
Erwinia: peu sensible / 6
Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: peu sensible / 8
Galle verruqueuse F18: - / -
Nématode doré Ro 1/4: - / -
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode blanc Pa 2: - / -
Nématode blanc Pa 3: - / -

Desmazières An Agrico company.
Desmazières SA • Z.I. Artoipôle BP 62008 • 62060 Arras Cedex 9 • La France
webmaster@desmazieres.fr www.desmazieres.fr
AGRICO