

Sinora.

Sinora est une pomme de terre à haut rendement et facile à cultiver, pour une récolte précoce destinée à la transformation en frites ou en chips.



Industrie
Frites
Chips

- ▶ **Productivité régulière**
- ▶ **Bonne teneur en matière sèche**
- ▶ **Tubercules homogènes**



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Obtenteur: J. Schilt
Croisement: AGRIA x AM 70-2166
Droits d'obteneur: 31-12-2027
Code de semis: SI 85-0482

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-hâtive / 7
Couleur du germe: bleu violet / BV
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: très élevé / 4
Feuillage - développement initial: rapide / 8
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7,5
Feuillage - facilité d'épuration: plutôt facile / 7
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: moyenne / 6
Forme du tubercule: oblong rond / OR
Régularité de la forme: assez régulière / 6
Tubérisation: assez élevée / 7
Taille du tubercule: assez gros / 7
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
Coups bleus: assez sensible / 6,5
Crevasses: assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte: très sensible / 4,5
Bentazone: assez sensible / 6,5
Éthylène: - / -
Poids sous eau: 416
Matière sèche: 22,6%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson: sensible / 5
Grisaillement: sensible / 5
Fritabilité: très bonne / 7,5
Répartition de la matière sèche: bonne / 7
Chipabilité: bonne / 7
Niveau de glyco-alcaloïde: 8,2
Huile de menthe: 15% à 25% de tubercules en plus / 7



ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation et traitement du plant ¹

Azote: conseil standard + 25%. L'utilisation de fumier est déconseillée.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard + 10%.

Traitement de semence

Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation. Un troisième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Distances de plantation

28/35 mm : 47000 pieds/ha

35/50 mm : 37000 pieds/ha

50/55 mm : 32000 pieds/ha

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.



Résistances

Virus - Enroulement: peu sensible / 6

Virus - Y: peu sensible / 7

Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 7

Virus du mop top: peu sensible / 6

Mildiou du feuillage: très sensible / 4,5

Mildiou du tubercule: sensible / 5

Fusariose: peu sensible / 6

Gale commune: sensible / 5,5

Gale poudreuse: sensible / 5

Virus - A: - / -

Virus - X: peu à pas sensible / 8,5

Dartrose: - / -

Erwinia: peu sensible / 6

Galle verruqueuse F1: - / -

Galle verruqueuse F6: - / -

Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3: - / -

Nématode blanc Pa 2: sensible / 4

Nématode blanc Pa 3: sensible / 2