

# Tresor.

Tresor est une pomme de terre très hâtive, variété adaptée au marché du frais.



Industrie



Frais  
Retail

- ▶ Très précoce en calibre et matière sèche
- ▶ Excellentes frites ménagères
- ▶ Très productive en gros calibres



## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques générales

Obtenteur: CEBECO

Croisement: CORINE x FRESCO

Droits d'obteneur: Expiré

Code de semis:

### Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: hâtive / 7,5

Couleur du germe: rouge violet / RV

Couleur de la fleur: blanche / W

Feuillage - développement initial: moyen / 6,5

Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7

Feuillage - facilité d'épuration: normale / 6

Couleur de la peau: jaune / Y

Couleur de la chair: jaune pâle / 5,5

Finition de la peau: lisse / 7

Forme du tubercule: oblong / O

Régularité de la forme: régulière / 7

Tubérisation: assez faible / 5,5

Taille du tubercule: gros / 8

Homogénéité de la taille: régulière / 7

Dormance: moyenne / 6

### Sensibilité et qualité

Repousse: sensible / 5,5

Coups bleus: assez sensible / 6

Crevasses: très sensible / 4

Endommagement à la récolte: sensible / 5,5

Poids sous eau: 345

Matière sèche: 19%

Type de cuisson: légèrement farineuse / B

Noircissement après cuisson: assez sensible / 6

Grisaillement: assez sensible / 6,5

Fritabilité: très bonne / 7,5

Chipabilité: bonne / 7

Niveau de glyco-alcaloïde:



# ITINÉRAIRE TECHNIQUE

## Fertilisation et traitement du plant <sup>1</sup>

Azote: conseil standard.

Phosphore: conseil standard + 10%.

Potasse: conseil standard.

## Traitement de semence

Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement.

## Distances de plantation

28/35 mm : 47000 pieds/ha

35/45 mm : 40000 pieds/ha

45/50 mm : 36000 pieds/ha

<sup>1</sup> Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

## Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

## Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

## Récolte

Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

## Conservation - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 7 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.



## Résistances

Virus - Enroulement: peu sensible / 6

Virus - Y: peu sensible / 6

Virus - Y nécrotique (tubercule): peu à pas sensible / 8

Mildiou du feuillage: très sensible / 4

Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 8

Fusariose: peu sensible / 6

Gale commune: peu sensible / 6,5

Gale poudreuse: très sensible / 2,5

Virus - A: peu à pas sensible / 9

Virus - X: peu sensible / 7

Dartrose: peu sensible / 6,5

Erwinia: peu sensible / 6,5

Galle verruqueuse F1: résistante / 10

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9