Tresor.





Industrie

Frais Retail

- Très hâtive, variété mixte marché du frais et de l'industrie, très productive.
- Très précoce en calibre et matière sèche
- Excellentes frites ménagères
- Très productive en gros calibres



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Obtenteur: CEBECO

Croisement: CORINE x FRESCO Droits d'obtenteur: Expiré

Code de semis:

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: hâtive / 7,5

Couleur du germe: rouge violet / RV Couleur de la fleur: blanche / W

Feuillage - développement initial: moyen / 6,5

Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7

Feuillage - facilité d'épuration: normale / 6

Couleur de la peau: jaune / Y

Couleur de la chair: jaune pâle / 5,5

Finition de la peau: lisse / 7
Forme du tubercule: oblong / O
Régularité de la forme: régulière / 7
Tubérisation: assez faible / 5,5
Taille du tubercule: gros / 8

Homogénéité de la taille: régulière / 7

Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: sensible / 5,5

Coups bleus: assez sensible / 6 Crevasses: très sensible / 4

Endommagement à la récolte: sensible / 5,5

Métribuzine: assez sensible / 6

Poids sous eau: 345 Matière sèche: 19%

Type de cuisson: légèrement farineuse / B Noircissement après cuisson: assez sensible / 6

Grisaillement: assez sensible / 6,5

Fritabilité: très bonne / 7,5 Chipabilité: bonne / 7 Niveau de glyco-alcaloïde:







ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation et traitement du plant ¹

Azote: conseil standard.

Phosphore: conseil standard + 10%.

Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement.

Distances de plantation

28/35 mm : 47000 pieds/ha 35/45 mm : 40000 pieds/ha 45/50 mm : 36000 pieds/ha

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 7 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.



Résistances

Virus - Enroulement: peu sensible / 6

Virus - Y: peu sensible / 6

Virus - Y nécrotique (tubercule): peu à pas sensible / 8

Mildiou du feuillage: très sensible / 4

Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 8

Fusariose: peu sensible / 6

Gale commune: peu sensible / 6,5

Gale poudreuse: très sensible / 2,5

Virus - A: peu à pas sensible / 9

Virus - X: peu sensible / 7

Dartrose: peu sensible / 6,5

Erwinia: peu sensible / 6,5

Galle verruqueuse F1: résistante / 10

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9



