Arizona.

Arizona est une pomme de terre primeur de consommation, à l'excellent rendement sous divers climats.

- **Tubercules de forme et calibre très homogènes**
- **Bonne tolérance à la sécheresse**
- **Résistances à de multiples virus**

Frais



Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: UK 150-19D22 x MASCOTTE
Droits d'obtenteur: 31-12-2040
Code de semis: AR 98-0313

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-hâtive / 7
Couleur du germe: rouge violet / RV
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: assez élevé / 5
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: moyenne / 6
Feuillage - facilité d'épuration: normale / 6,5
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: assez lisse / 6,5
Forme du tubercule: oblong / O
Régularité de la forme: régulière / 7,5
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: gros / 8
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: peu sensible / 7
Coups bleus: peu sensible / 7
Crevasses: peu sensible / 7
Endommagement à la récolte: peu sensible / 7
Bentazone: peu sensible / 7
Éthylène: 15% à 25% de tubercules en plus / 7
Poids sous eau: 301
Matière sèche: 17%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Noircissement après cuisson: assez sensible / 6,5
Grisaillement: - / -
Fritabilité: mauvaise / 4
Répartition de la matière sèche: - / -
Chipabilité: mauvaise / 4
Niveau de glyco-alcaloïde: 4,2 mg/100g
Huile de menthe: 5% à 15% de tubercules en plus / 6

Desmazières An Agrico company.

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu toute information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les ommissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable des dommages résultant ou liés aux informations contenues dan ces fiches.

AGRICO

Conseils de culture

Fertilisation et traitement du plant [1]

Azote: conseil standard - 10%.
Phosphore: conseil standard.
Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Distances de plantation

28/35 mm : 27 cm (50.000 plantes/ha)
35/55 mm : 30 cm (45.000 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.



Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu à pas sensible / 8
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu à pas sensible / 8
Virus du mop top: sensible / 5
Mildiou du feuillage: très sensible / 4
Mildiou du tubercule: sensible / 5
Fusariose: peu sensible / 6
Gale commune: sensible / 5,5
Gale poudreuse: très sensible / 2
Virus - A: - / -
Virus - X: peu à pas sensible / 8
Dartrose: très sensible / 4
Erwinia: peu sensible / 6
Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: assez sensible / 6
Galle verruqueuse F18: - / -
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode blanc Pa 2: - / -
Nématode blanc Pa 3: - / -

Desmazières An Agrico company.
Desmazières SA • Z.I. Artoipôle BP 62008 • 62060 Arras Cedex 9 • La France
webmaster@desmazieres.fr www.desmazieres.fr
AGRICO