PRÉCONISATIONS CULTURALES

Chateau.

Chateau est une pomme de terre à chair ferme, précoce, avec une bonne tubérisation, une belle présentation et une aptitude à la conservation.

- **Tubercules réguliers et homogènes**
- **Excellente qualité gustative**
- **Chair jaune**

Frais
Vapeur



Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: MA 98-0322 x AR 98-0341
Droits d'obtenteur: 31-12-2046
Code de semis: AR 05-1443

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: hâtive / 7,5
Couleur du germe: bleu violet / BV
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: assez élevé / 5,5
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7
Feuillage - facilité d'épuration: plûtot facile / 7
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: lisse / 7
Forme du tubercule: oblong long / LO
Régularité de la forme: régulière / 7
Tubérisation: élevée / 8
Taille du tubercule: assez gros / 7
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
Coups bleus: peu à pas sensible / 8
Crevasses: assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte: sensible / 5
Bentazone: peu sensible / 7,5
Éthylène: 5% à 15% de tubercules en plus / 6
Poids sous eau: 350
Matière sèche: 19,2%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Noircissement après cuisson: peu sensible / 7,5
Grisaillement: peu sensible / 7,5
Fritabilité: mauvaise / 4
Répartition de la matière sèche: - / -
Chipabilité: mauvaise / 4
Niveau de glyco-alcaloïde: 4,2 mg/100g
Huile de menthe: 5% à 15% de tubercules en plus / 6

Desmazières
An Agrico company.

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu toute information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les ommissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable des dommages résultant ou liés aux informations contenues dan ces fiches.

AGRICO

Conseils de culture

Fertilisation et traitement du plant [1]

Azote: conseil standard.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard + 20%.

Traitement de semence

Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement.Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Distances de plantation

28/35 mm : 57000 pieds/ha
35/45 mm : 50000 pieds/ha
45/50 mm : 45000 pieds/ha

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à un stockage à moyen terme.



Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu sensible / 7
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 6,5
Virus du mop top: sensible / 5
Mildiou du feuillage: très sensible / 4
Mildiou du tubercule: sensible / 5,5
Fusariose: peu sensible / 7
Gale commune: sensible / 5,5
Gale poudreuse: très sensible / 2
Virus - A: - / -
Virus - X: - / -
Dartrose: très sensible / 4,5
Erwinia: - / -
Galle verruqueuse F1: peu sensible / 8
Galle verruqueuse F6: - / -
Galle verruqueuse F18: - / -
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode blanc Pa 2: - / -
Nématode blanc Pa 3: - / -

Desmazières
An Agrico company.
Desmazières SA • Z.I. Artoipôle BP 62008 • 62060 Arras Cedex 9 • La France
webmaster@desmazieres.fr www.desmazieres.fr
AGRICO