PRÉCONISATIONS CULTURALES

Constance.

Variété demi-hâtive de consommation, adaptée à de nombreux terroirs de par sa rusticité.

- **Belle présentation**
- **Tubercules de taille très uniforme**
- **Résultats très réguliers**

Frais

characteristics

Caractéristiques générales

Obtenteur: J.L. Spijkman
Croisement: MARABEL x AR 93-1243
Droits d'obtenteur: 31-12-2044
Code de semis: SA 02-0020

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-hâtive / 7
Couleur du germe: bleu violet / BV
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: moyen / 6
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7
Feuillage - facilité d'épuration: normale / 6,5
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: excellente / 8
Forme du tubercule: oblong rond / OR
Régularité de la forme: régulière / 7
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: assez gros / 7
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: moyenne / 6,5

Sensibilité et qualité

Repousse: peu sensible / 7
Coups bleus: peu à pas sensible / 8
Crevasses: peu sensible / 7
Endommagement à la récolte: très sensible / 4,5
Métribuzine: peu sensible / 7
Métribuzine: peu sensible / 7,5
Bentazone: peu à pas sensible / 8
Éthylène: 15% à 25% de tubercules en plus / 7
Poids sous eau: 358
Matière sèche: 19,7%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Noircissement après cuisson: assez sensible / 6,5
Grisaillement: assez sensible / 6,5
Fritabilité: assez mauvaise / 5,5
Répartition de la matière sèche: - / -
Chipabilité: mauvaise / 4
Niveau de glyco-alcaloïde: 4,3
Huile de menthe: 5% à 15% de tubercules en plus / 6

Desmazières An Agrico company.

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu toute information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les ommissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable des dommages résultant ou liés aux informations contenues dan ces fiches.

AGRICO

How to grow

Fertilisation et traitement du plant [1]

Azote: conseil standard + 15%.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard + 15%.

Traitement de semence

Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation.Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Planting distance

28/35 mm : 48000 pieds/ha
35/45 mm : 42000 pieds/ha
45/50 mm : 37000 pieds/ha

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu à pas sensible / 8
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 6,5
Virus du mop top: peu sensible / 6
Mildiou du feuillage: sensible / 5
Mildiou du tubercule: très sensible / 4,5
Fusariose: peu sensible / 6,5
Gale commune: peu sensible / 6
Gale poudreuse: très sensible / 3
Virus - A: - / -
Virus - X: peu sensible / 7
Dartrose: peu sensible / 7
Erwinia: peu sensible / 6
Galle verruqueuse F1: - / -
Galle verruqueuse F6: - / -
Galle verruqueuse F18: - / -
Nématode doré Ro 1/4: - / -
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode blanc Pa 2: - / -
Nématode blanc Pa 3: - / -

Desmazières
An Agrico company.

Desmazières SA • Z.I. Artoipôle BP 62008 • 62060 Arras Cedex 9 • La France
webmaster@desmazieres.fr www.desmazieres.fr

AGRICO