

Jacky.

Variété primeur de petit calibre, avec un rendement élevé et résistante au mildiou du feuillage et des tubercules.



Industrie
4ème
gamme



Frais
Grenailles

- ▶ **Tubercules très réguliers**
- ▶ **Tubérisation élevée**
- ▶ **Très peu sensible aux endommagements à la récolte**



characteristics

Caractéristiques générales

Obtenteur: Lantmännen Seed B.V.
Croisement: ANOUK x ATHLETE
Droits d'obteneur: 31-12-2049
Code de semis: SW 09-0557

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-hâtive / 6,5
Couleur du germe: vert rouge / GR
Couleur de la fleur: mauve pâle / LP
Nombre de baies: assez faible / 6,5
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final: assez bon / 7,5
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7
Feuillage - facilité d'épuration: plutôt facile / 7
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: assez lisse / 6,5
Forme du tubercule: oblong rond / RO
Régularité de la forme: assez régulière / 6,5
Tubérisation: élevée / 9
Taille du tubercule: moyen / 6,5
Homogénéité de la taille: assez régulière / 6
Dormance: assez courte / 5,5

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6
Coups bleus: peu à pas sensible / 8
Crevasses: assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte: peu à pas sensible / 8
Métribuzine: peu sensible / 7,5
Métribuzine: peu sensible / 7
Bentazone: - / -
Éthylène: 15% à 25% de tubercules en plus / 7
Poids sous eau: 368
Matière sèche: 20,1%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson: assez sensible / 6,5
Grisaillement: assez sensible / 6
Fritabilité: assez mauvaise / 5,5
Répartition de la matière sèche: bonne / 7
Chipabilité: mauvaise / 5
Niveau de glyco-alcaloïde: 14,05
Huile de menthe: 5% de tubercules en moins / 4



How to grow

Fertilisation et traitement du plant ¹

Azote: conseil standard.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement. Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Planting distance

30/40 mm : 70000 pieds/ha

40/50 mm : 62000 pieds/ha

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Protection fongicide

Malgré sa résistance au mildiou, surveillez le risque d'infection.

Récolte

Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.



Résistances

Virus - Enroulement: - / -

Virus - Y: très sensible / 4,5

Virus - Y nécrotique (tubercule): peu à pas sensible / 8

Virus du mop top: peu sensible / 6

Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9

Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 9

Fusariose: sensible / 5,5

Gale commune: sensible / 5,5

Gale poudreuse: très sensible / 2

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Dartrose: peu sensible / 6

Erwinia: - / -

Galle verruqueuse F1: - / -

Galle verruqueuse F6: - / -

Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3: - / -

Nématode blanc Pa 2: - / -

Nématode blanc Pa 3: - / -