Napoleon.

Napoleon est une pomme de terre de conservation, destinée à la transformation en chips, aux calibres homogènes et à teneur en matière sèche élevée.

- **Bonne aptitude à la transformation en chips**
- **Convient à la transformation en flocons**
- **Bonne résistance aux virus**

Industrie
Chips



Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: ANTINA x ALICANTE
Droits d'obtenteur: 31-12-2051
Code de semis: AR 10-4637

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: tardive / 5
Couleur du germe: rouge violet / RV
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: très élevé / 4
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7,5
Feuillage - facilité d'épuration: normale / 6,5
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: assez terne / 5
Forme du tubercule: oblong rond / RO
Régularité de la forme: régulière / 7
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
Coups bleus: sensible / 5,5
Crevasses: assez sensible / 6
Endommagement à la récolte: très sensible / 4,5
Bentazone: - / -
Éthylène: 5% de tubercules en plus ou en moins / 5
Poids sous eau: 450
Matière sèche: 24,1%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Noircissement après cuisson: assez sensible / 6
Grisaillement: assez sensible / 6
Fritabilité: bonne / 7
Répartition de la matière sèche: bonne / 7
Chipabilité: excellente / 8
Niveau de glyco-alcaloïde: 4,0 mg/100g
Huile de menthe: 25% de tubercules en plus / 8

Desmazières
An Agrico company.

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu toute information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les ommissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable des dommages résultant ou liés aux informations contenues dan ces fiches.

AGRICO

Conseils de culture

Fertilisation et traitement du plant [1]

Azote: conseil standard - 10%.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard + 20%.

Traitement de semence

Une prégermination, après avoir retiré le premier germe apical, peut accroître le niveau de tubérisation.Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Distances de plantation

28/35 mm : 54000 pieds/ha
35/50 mm : 47000 pieds/ha
50/55 mm : 35000 pieds/ha

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme de pulvérisation préventif contre le mildiou est conseillé.

Récolte

Récolte recommandée après minimum 3 semaines de défanage.

Conservation - Durée de stockage

Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 9 °C. Convient à un stockage de moyen à long terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.



Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu à pas sensible / 8
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu à pas sensible / 8
Virus du mop top: sensible / 5
Mildiou du feuillage: peu sensible / 6
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6,5
Fusariose: peu sensible / 6,5
Gale commune: peu sensible / 6
Gale poudreuse: - / -
Virus - A: - / -
Virus - X: - / -
Dartrose: peu sensible / 6
Erwinia: - / -
Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: - / -
Galle verruqueuse F18: - / -
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode blanc Pa 2: sensible / 4
Nématode blanc Pa 3: sensible / 2

Desmazières
An Agrico company.
Desmazières SA • Z.I. Artoipôle BP 62008 • 62060 Arras Cedex 9 • La France
webmaster@desmazieres.fr www.desmazieres.fr
AGRICO