Tresor.

Tresor est une pomme de terre très hâtive, variété adaptée au marché du frais.

- **Très précoce en calibre et matière sèche**
- **Excellentes frites ménagères**
- **Très productive en gros calibres**

Industrie **Frais** Retail

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: CEBECO
Croisement: CORINE x FRESCO
Droits d'obtenteur: Expiré
Code de semis:

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: hâtive / 7,5
Couleur du germe: rouge violet / RV
Couleur de la fleur: blanche / W
Feuillage - développement initial: moyen / 6,5
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7
Feuillage - facilité d'épuration: normale / 6
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune pâle / 5,5
Finition de la peau: lisse / 7
Forme du tubercule: oblong / O
Régularité de la forme: régulière / 7
Tubérisation: assez faible / 5,5
Taille du tubercule: gros / 8
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: sensible / 5,5
Coups bleus: assez sensible / 6
Crevasses: très sensible / 4
Endommagement à la récolte: sensible / 5,5
Poids sous eau: 345
Matière sèche: 19%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson: assez sensible / 6
Grisaillement: assez sensible / 6,5
Fritabilité: très bonne / 7,5
Chipabilité: bonne / 7
Niveau de glyco-alcaloïde:

Desmazières An Agrico company.

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu toute information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les ommissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable des dommages résultant ou liés aux informations contenues dan ces fiches.

AGRICO

Conseils de culture

Fertilisation et traitement du plant [1]

Azote: conseil standard.

Phosphore: conseil standard + 10%.

Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après une période de réchauffement.

Distances de plantation

28/35 mm : 47000 pieds/ha

35/45 mm : 40000 pieds/ha

45/50 mm : 36000 pieds/ha

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

Récolte recommandée après minimum 2 semaines de défanage.

Conservation - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 7 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Résistances

Virus - Enroulement: peu sensible / 6

Virus - Y: peu sensible / 6

Virus - Y nécrotique (tubercule): peu à pas sensible / 8

Mildiou du feuillage: très sensible / 4

Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 8

Fusariose: peu sensible / 6

Gale commune: peu sensible / 6,5

Gale poudreuse: très sensible / 2,5

Virus - A: peu à pas sensible / 9

Virus - X: peu sensible / 7

Dartrose: peu sensible / 6,5

Erwinia: peu sensible / 6,5

Galle verruqueuse F1: résistante / 10

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Desmazières An Agrico company.

Desmazières SA • Z.I. Artoipôle BP 62008 • 62060 Arras Cedex 9 • La France

webmaster@desmazieres.fr www.desmazieres.fr

AGRICO